

Produits 2017-2018	Clientèles cibles
Flulaval Tetra Quadrivalent (Boite 1 fiole multidose, 2.7cm x 6.9cm x 2.7cm)	Enfants âgés 6 à 23 mois Enfants âgés de 2-17 ans ¹ ayant une contre-indication au Flumist Quadrivalent
Flumist Quadrivalent (Boite 10 vaporisateurs, 10.4cm x 17.5cm x 2.8cm)	Enfants âgés de 2-17 ans ¹ : · atteints maladies chroniques · contacts domiciliaires de personnes à risque élevé
Fluviral (Boite 1 fiole multidose, 2.7cm x 6.9cm x 2.7cm)	18 ans et plus ^{1,2}
Agriflu (Boite 10 seringues, 11cm x 4cm x 10cm) (Boite 1 fiole multidose, 3cm x 7cm x 3cm)	18 ans et plus ^{1,2}
Influvac (Boite 10 seringues, 18.8 cm x 15.2 cm x 1.7 cm)	18 ans et plus ³
Fluad (Boite 10 seringues, 11cm x 4cm x 10cm)	65 ans et plus hébergées en CHSLD

¹ Chez les enfants visés âgés de 2 à 17 ans, les vaccins inactivés injectable ou vivant atténué intranasal peuvent être utilisés.

² Bien que ce vaccin soit « réservé » pour les personnes âgées de 18 ans et plus, il peut être utilisé à partir de l'âge de 6 mois, entre autres, chez les 2-17 ans.

³ Le vaccin Influvac est homologué chez les personnes âgées de 18 ans et plus, mais le CIQ en autorise l'utilisation à partir de l'âge de 6 mois.

Pneumovax 23 (Boite 10 fioles)	65 ans et plus 2 à 64 ans à risque accru d'infection invasive à pneumocoque (voir PIQ 2013, section 10.3.4)
Prevnar 13 (Boite 10 seringues)	2 mois à 59 mois 5 ans à 17 ans à risque accru d'infection invasive à pneumocoque (voir PIQ 2013, section 10.3.3) 18 ans et plus présentant une des conditions suivantes : · Asplénie anatomique ou fonctionnelle · États d'immunosuppression