



## MISE EN TENSION DE LA SALLE D'URGENCE PAR LES SPU (10-10, 10-100)

Dossier : \_\_\_\_\_

Nom, Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_ ☐ F ☐ M

AAAA-MM-JJ

NAM : \_\_\_\_\_ Exp. \_\_\_\_\_

AAAA-MM

Nom de la mère : \_\_\_\_\_

DATE : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ HEURE : \_\_\_\_ h \_\_\_\_

N° VÉHICULE : \_\_\_\_\_

COMPAGNIE : \_\_\_\_\_

LIEU D'APPEL : \_\_\_\_\_

### 1. SEXE ET ÂGE

☐ Féminin ☐ Masculin Âge : \_\_\_\_\_

### 2. RAISON DE L'ENCODAGE

☐ ACR médical ☐ ACR traumatique Heure : \_\_\_\_\_

☐ Agressivité ☐ Agitation

☐ Contention ☐ Intoxication

☐ Altération de l'état de conscience (A-V-P-U)

☐ AVC ☐ Dyspnée

☐ Réaction anaphylactique

☐ Traumatisé

☐ Événement avec victimes multiples (inscrire le nombre)

ROUGE : \_\_\_\_ JAUNE : \_\_\_\_ VERT : \_\_\_\_ NOIR : \_\_\_\_

### 3. ÉTAT NEUROLOGIQUE / AVC

**A V P U**

☐ AVC au réveil ou plus de 5 h

☐ AVC aigu moins de 5 h (entre le début des symptômes et l'arrivée à l'urgence)

**Attention aux critères de reperfusion endovasculaire!**

▶ Âge 16 ans et plus ☐ Oui ☐ Non

▶ A V P U = A - V

▶ Glycémie supérieure ou égale à 3 mmol / L

▶ Patient n'est pas dans une condition où il reçoit des soins de fin de vie

☐ Test Cincinnati : \_\_\_\_ / 3 ☐ Glasgow : \_\_\_\_ / 15

### 4. SIGNES VITAUX

Fréquence respiratoire : \_\_\_\_ / min GCS : \_\_\_\_

Fréquence cardiaque : \_\_\_\_ / min AVPU : \_\_\_\_

T. A. : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

SpO<sub>2</sub> : \_\_\_\_ % air ambiant

\_\_\_\_ % avec O<sub>2</sub> à \_\_\_\_ L / min

ETCO<sub>2</sub> : \_\_\_\_

Glycémie capillaire : \_\_\_\_ mmol / L

### 5. CARDIO / IPIM

☐ Douleur thoracique : \_\_\_\_ / 10 ou ☐ Asymptomatique

Infarctus confirmé / Nom du médecin : \_\_\_\_\_

Hôpital de destination : \_\_\_\_\_

Interprétation de l'ECG : \_\_\_\_\_

Numéro d'identification de l'ECG : \_\_\_\_\_

### 6. EQPT (échelle québécoise de triage préhospitalier trauma)

Étapes (encerclez) : 1 2 3 4 5

Critères : \_\_\_\_\_

### 7. HISTOIRE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 8. TRAITEMENT(S) DONNÉ(S) OU EN COURS PAR LES SPU

☐ Assistance ventilatoire

☐ Combitube

☐ Contrôle d'hémorragie : \_\_\_\_\_

☐ CPAP : \_\_\_\_ cm H<sub>2</sub>O ou \_\_\_\_ L / min

☐ RCR / Défibrillation / n<sup>bre</sup> de choc(s) : \_\_\_\_\_

### 9. MÉDICAMENT(S) DONNÉ(S) OU EN COURS PAR LES SPU

☐ Glucagon : \_\_\_\_\_

☐ Salbutamol : \_\_\_\_\_

☐ Fentanyl : \_\_\_\_\_

☐ Narcan : \_\_\_\_\_

☐ Épinéphrine : \_\_\_\_\_

☐ Midazolam : \_\_\_\_\_

☐ AAS : \_\_\_\_\_

☐ TNT : \_\_\_\_\_

☐ Autres : \_\_\_\_\_

### 10. ESTIMATION DU TEMPS D'ARRIVÉE (ETA)

\_\_\_\_\_ minutes

### 11. ORIENTATION PATIENT

☐ Triage

☐ Salle de réanimation

☐ Autre (spécifiez) : \_\_\_\_\_

### SIGNATURE

\_\_\_\_\_