



NOUVELLES DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE

Modifications au formulaire

MÉDICAMENT	INDICATION(S)
Ajout : acetaminophène injectable 1000 mg/100 mL	L'utilisation est restreinte aux indications retenues par l'INESSS soit le traitement de la douleur ou de la fièvre chez les adultes ou les enfants âgés d'au moins deux ans lorsque les voies orales et rectales ne peuvent être utilisées.

Substitutions automatiques par le pharmacien

Amoxicilline/clavulanate de potassium (**Clavulin**) 250-125 mg DIE ou BID est substitué par amoxicilline/clavulanate de potassium (**Clavulin**) 500-125 mg DIE ou BID.

Le tableau des substitutions automatiques des corticostéroïdes topiques a été mis à jour afin de refléter les formulations actuellement disponibles sur le marché.

La liste complète des substitutions automatiques par le pharmacien est disponible sur l'intranet.

Ordonnances individuelles pré-imprimées (nouvelles et révisions)

OIPI-663 : Protocole de chimiothérapie ABVD

OIPI-664 : Protocole de chimiothérapie CyBorD

OIPI-665 : Protocole de chimiothérapie R-FC

OIPI-666 : Protocole de chimiothérapie obinutuzumab (Gazyva) C1

OIPI-667 : Protocole de chimiothérapie obinutuzumab (Gazyva) C2 à C6

OIPI-668 : Protocole de chimiothérapie R-bendamustine

OIPI-669 : Protocole de chimiothérapie R-CHOP

OIPI-671 : Protocole de chimiothérapie R-CPV

OIPI-673 : Protocole de chimiothérapie R-GDP

OIPI-674 : Protocole de chimiothérapie azacitidine (Vidaza)

OIPI-712 : Traitement de l'agitation, de l'agressivité et de l'anxiété - clientèle psychiatrique (révision)

OIPI-792 : Gestion du sevrage alcoolique en ambulatoire – 65 ans et moins

OIPI-793 : Gestion de l'agitation, de l'agressivité et des symptômes psychotiques en délirium ou SCPD (symptômes comportementaux et psychologiques de la démence)

OIPI-801 : Clinique externe – chirurgie mineure

Les outils à jour sont disponibles sur l'intranet.

Ordonnances collectives (nouvelles et révisions)

OC-6076 : Initier le traitement de sacubitril-valsartan chez les usagers suivis à la clinique d'insuffisance cardiaque

OC-6077 : Ajuster le traitement de sacubitril-valsartan chez les usagers suivis à la clinique d'insuffisance cardiaque

Les outils à jour sont disponibles sur l'intranet.

Divers

Nous rappelons à tous les prescripteurs d'utiliser le BCM de congé (lorsque disponible) ou le sommaire pharmacologique au dossier de l'usager pour faire la prescription de départ. Ces outils porteront à votre attention les substitutions automatiques faites durant l'hospitalisation et vous permettront de reprendre la médication usuelle du domicile si toujours pertinent.