

## NOUVELLES DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE

### Modifications au formulaire

| MÉDICAMENT                             | INDICATION(S)                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mépipivacaïne 2%, sol. inj.            | Utilisation réservée pour bloc moteur de courte durée dans les chirurgies orthopédiques en CDJ |
| Betaméthasone valérate 0,05% lot. top. | Corticostéroïde de puissance modérée en lotion                                                 |

### Substitutions automatiques par le pharmacien

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amlodipine + perindopril aginine (Viacoram) comprimé est substitué par Amlodipine + perindopril erbumine à dose équivalente servis séparément                                 |
| Estrone crème vaginale est substitué par Estrogènes conjugués crème vaginale                                                                                                  |
| Acyclovir crème topique est substitué par acyclovir pommade topique                                                                                                           |
| Cinchocaïne/dibucaïne 1% pommade topique (Nupercaïnal) est substitué par lidocaïne 5% pommade topique                                                                         |
| Miconazole (et autres) cr. vag. est substitué par clotrimazole 2% cr. vag. DIE pour 3 jours. Chez la femme enceinte, le clotrimazole 1% cr. vag. DIE pour 6 jours sera servi. |
| Fluocinolone acetonide (Synalar) 0,01% lot. top. est substitué par betamethasone valérate 0,05% lot. top.                                                                     |

*La liste complète des substitutions automatiques par le pharmacien est disponible sur l'intranet.*

### Ordonnances individuelles pré-imprimées (nouvelles et révisions)

- OIPI-627** : Analgésie par voie neuroaxiale – épimorph (révision)
- OIPI-798** : Admission unité COVID-19 en hôpital (révision durée corticothérapie). Une révision de la section thromboprophylaxie et anticoagulation à dose thérapeutique sera faite au comité d'octobre.
- OIPI-805** : Aide médicale à mourir (version CISSMO indiquant le service de la trousse #2 en fioles)
- OIPI-884** : Tocilizumab chez les usagers atteints de COVID-19
- OIPI-885** : Protocole médical national INESSS
- OIPI-886** : Varenicline ou bupropion pour sevrage ou abandon du tabagisme

*Les outils à jour sont disponibles sur l'intranet.*

## Ordonnances collectives (nouvelles et révisions)

Nil

*Les outils à jour sont disponibles sur l'intranet.*