
DESTINATAIRE : Personnel infirmier du CISSS Montérégie Ouest

EXPÉDITEUR : Département de pharmacie

DATE : 2022-11-16

OBJET : **Préparation : amoxicilline-clavulanate pour injection**

Nous vous transmettons l'information pour ce nouveau médicament qui vient d'être ajouté à notre formulaire thérapeutique. Le prescripteur doit utiliser l'OIPI-921 pour prescrire. Les fioles se retrouvent dans les cabinets automatisés décentralisés de nos 3 hôpitaux.

PRÉSENTATION :

Fiole de 500 mg-100 mg (500 mg amoxicilline sodique + 100 mg clavulanate de potassium (pdr)
Fiole de 1000 mg-200 mg (1000 mg amoxicilline sodique + 200 mg clavulanate de potassium (pdr)
Fiole de 2000 mg-200 mg (2000 mg amoxicilline sodique + 200 mg clavulanate de potassium (pdr)

PRÉPARATION EN MINIBAG PLUS :

- 1- Assembler la fiole au Minibag Plus de 100 mL de NaCl 0,9%
- 2- Débuter l'administration une fois la fiole complètement diluée

PRÉPARATION EN MINISAC STANDARD (lorsque Minibag Plus non disponible) :

- 1- Dissoudre la poudre (500 mg-100 mg) avec 10 mL d'eau stérile pour injection (50 mg/mL amoxicilline + 10 mg/mL clavulanate)

Dissoudre la poudre (1000 mg-200 mg) avec 20 mL d'eau stérile pour injection (50 mg/mL amoxicilline + 10 mg/mL clavulanate)

Dissoudre la poudre (2000 mg-200 mg) avec 20 mL d'eau stérile pour injection (100 mg/mL amoxicilline + 10 mg/mL clavulanate)

Après la dissolution dans l'eau pour injection, la solution pourrait provisoirement avoir une teinte rosée, mais elle deviendra rapidement transparente.

ATTENTION : si la dose de 2000 mg-200 mg est prescrite, NE PAS UTILISER 2 fioles de 1000 mg-200 mg car la quantité de clavulanate sera doublée.

- 2- Prélever la dose comme suit:

Dose	Volume correspondant
500 mg-100 mg	10 mL
1000 mg-200 mg	20 mL
2000 mg-200 mg	20 mL

- 3- Ajouter la dose dans un minisac de 100 mL de NaCl 0,9%. Le médicament ainsi dilué est stable 1 heure à température ambiante. Il ne faut donc pas préparer à l'avance.

ADMINISTRATION : Administrer en 30 minutes

PHARMACOVIGILANCE : Nausée, vomissement, diarrhée, anorexie, candidose muco-cutanée.

SG