

Installation : _____

SUIVI INFIRMIER LORS DE TRAITEMENT AUX THYMORÉGULATEURS-ACIDE VALPROÏQUE-DIVALPROEX SODIQUE

Dossier : _____

Nom, prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
aaaa/mm/jj

NAM : _____ Exp. _____
aaaa/mm

Nom, prénom de la mère : _____

Test, Analyses, Examens	Date	Initiales	Suivi des résultats	Initiales
PRÉTRAITEMENT				
Examen physique complet (si datant de plus de 6 mois)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Poids : _____ kg	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Taille : _____ m	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
IMC : _____ (kg/m ²)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Créatinine sérique	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Électrolytes : Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Amoniaque (si maladie hépatique)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
β-HCG sanguin (si en âge de procréer)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
PRL/FSH/LH/testostérone (chez la femme avec irrégularités menstruelles ou symptômes d'hyperandrogénisme)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
6 PREMIERS MOIS				
(incluant après un changement de dose ou de forme pharmaceutique (comprimé/liquide), après l'ajout d'un médicament susceptible de modifier la concentration plasmatique (ex : lamotrigine) ou suite à un changement physiologique ou pathologique (ex : insuffisance rénale de novo))				
Jour 5 : Dosage acide valproïque	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Jour 10 : Dosage acide valproïque	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Aux 4 à 7 jours : Dosage acide valproïque jusqu'à l'obtention de 2 valeurs dans l'intervalle thérapeutique.	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Aux 4 à 7 jours : Dosage acide valproïque jusqu'à l'obtention de 2 valeurs dans l'intervalle thérapeutique.	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Aux 4 à 7 jours : Dosage acide valproïque jusqu'à l'obtention de 2 valeurs dans l'intervalle thérapeutique.	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
14 jours :				
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Mois 1 :				
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Mois 2 :				
Poids : _____ kg	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Mois 4 :				
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Mois 6 :				
Poids : _____ kg	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Dosage acide valproïque	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	

Test, Analyses, Examens	Date	Initiales	Suivi des résultats	Initiales
APRÈS 6 MOIS				
Aux 6-12 mois :				
Poids : _____ kg	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Si prise de poids > ou = à 4,5 kg ou 5% du poids initial dans le premier 12 mois				
IMC _____ (kg/m2)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Tour de taille _____ cm	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Glycémie à jeun	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Profil lipidique	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Pouls _____	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
TA : Bras G D /	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Aux 6-12 mois :				
Poids : _____ kg	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Si prise de poids > ou = à 4,5 kg ou 5% du poids initial dans le premier 12 mois				
IMC _____ (kg/m2)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Tour de taille _____ cm	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Glycémie à jeun	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Profil lipidique	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Pouls _____	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
TA : Bras G D /	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Aux 6-12 mois :				
Poids : _____ kg	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
FSC	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Bilan hépatique (ALT)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Si prise de poids > ou = à 4,5 kg ou 5% du poids initial dans le premier 12 mois				
IMC _____ (kg/m2)	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Tour de taille _____ cm	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Glycémie à jeun	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Profil lipidique	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Pouls _____	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
TA : Bras G D /	aaaa/mm/jj		aaaa/mm/j	
Respecter un délai de 12 heures entre la dernière prise du médicament et le prélèvement. Si ce délai ne peut pas être respecté, inscrire l'heure de la dernière prise de l'acide valproïque sur la requête de prélèvement.				

INITIALES	SIGNATURE ET TITRE	INITIALES	SIGNATURE ET TITRE