Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Québec

Dossier : _____

Nom, prénom : _____

Date de naissance : _____ (aaaa/mm/jj) ☐ F ☐ M

NAM : _____ Exp. _____ (aaaa/mm)

Nom, prénom de la mère : _____

Installation : _____

FORMULAIRE DE LIAISON PRÉVENTION DE L'INFLUENZA DE TYPE A OU B USAGER DE 13 ANS OU PLUS – OC-6124

En lien avec l'ordonnance collective : **OC-6124 Initier une prophylaxie contre la grippe causée par le virus de l'influenza lors d'une éclosion en CHSLD**

Pharmacie : _____ Télécopieur : _____

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

Médecin répondant consulté : _____

ÉVALUATION

☐ J'ai procédé à l'évaluation de l'usager identifié ci-dessus. Cet usager est admissible à recevoir le(s) médicament(s) identifié(s) par les initiales du prescripteur. Aucune ordonnance individuelle du même médicament générique n'est présente au dossier.

☐ Je me suis référé(e) à la version intégrale de l'ordonnance collective disponible sur l'Intranet du CISSSMO.

☐ L'usager ne présente aucune contre-indication énoncée dans l'ordonnance collective.

TRAITEMENT PROXYLACTIQUE

La durée de la prévention est généralement de 10 jours. Toutefois, lors d'éclosion en établissement de soins de santé, la prophylaxie devrait être maintenue durant 14 jours au minimum et jusqu'à 10 jours après la levée de l'éclosion par le service de prévention des infections (voir procédure au verso).

Initiales **Oseltamivir**

☐ 75 mg DIE (Clcr supérieure à 60 mL/min)

☐ 30 mg DIE (Clcr de 31 à 60 mL/min)

☐ 30 mg aux 2 jours (Clcr de 10 à 30 mL/min)

Clcr inférieure à 10 mL/min sans dialyse : **Usage non recommandé.**

☐ 30 mg STAT puis 30 mg aux 2 dialyses (Usager hémodialysé)

☐ 30 mg STAT puis 30 mg 1 fois/sem. (Usager avec dialyse péritonéale DPCA ou DPCC)

Pour l'usager hémodialysé, les doses recommandées sont basées sur une dialyse 3 fois par semaine.

La prophylaxie peut durer jusqu'à 14 jours lorsque le cas primaire est un enfant ou une personne âgée. Si l'usager devient symptomatique pendant la prophylaxie, aviser médecin pour conduite à tenir.

_____ Nom du médecin répondant

_____ Numéro de permis

_____ Nom et prénom de l'infirmière

_____ No permis de l'OIIQ

Signature de l'infirmière : _____ Date : _____ aaaa/mm/jj

LORS DE LA DÉCLARATION DE L'ÉCLOSION EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE SANTÉ PAR LE SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

En concertation avec le médecin répondant et le service de PCI, la prophylaxie devrait être offerte aux usagers asymptomatiques visés, vaccinés ou non (vous référer à la conseillère en prévention des infections pour connaître l'évolution de l'éclosion).

Voici la démarche à suivre :

Lorsque l'éclosion majeure est déterminée par le Service de prévention et contrôle des infections, l'infirmière consulte le médecin répondant afin de déterminer si la prophylaxie doit être envisagée. Si la décision est d'offrir la prophylaxie, l'infirmière initie *l'OC-6124* pour chacun des usagers selon son évaluation.

Lorsque l'équipe de la prévention et contrôle des infections déclare la fin de l'éclosion, l'infirmière achemine la liste des usagers au département de pharmacie afin de faire cesser la prophylaxie tel que déjà précisé sur l'ordonnance.

À noter que :

- Compléter au moins dix jours de prophylaxie antivirale après le début des symptômes du dernier cas
- Au congé d'un usager d'une unité en éclosion ou lors d'un transfert vers une autre unité non en éclosion (exposition cessée) : poursuivre la prophylaxie individuelle d'un usager pendant trois jours (période d'incubation) ou selon les recommandations du médecin traitant. Poursuivre la prophylaxie si la nouvelle unité est en éclosion.
- Cesser la prophylaxie des usagers et des travailleurs de la santé de toute l'unité en même temps.

Références :

- INSPQ - Mesures de prévention et de contrôle des virus respiratoires dans les milieux de soins : situation d'éclosion
- Lignes directrices de l'AMMI Canada (Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada) https://jammi.utpjournals.press/doi/10.3138/jammi.2019.02.08
- Nos collègues pharmaciens du BCRenalAgenc : https://www.dialyzeihd.com/index.php/antivirals/oseltamivir