

Installation : _____

Dossier : _____
Nom, Prénom : _____
Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ
NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM
Nom, Prénom de la mère : _____

FENTANYL EN OBSTETRIQUE EN PHASE DE TRAVAIL ACTIF

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

_____ Fentanyl 50 mcg IV q 30 minutes PRN
Initiales (max 450 mcg sur une période de 24 heures)

→ Débuter péridurale PRN si travail actif. Remplir l'OIPI-635 Analgésie par voie péridurale en obstétrique.

Consignes : Applicable chez l'usagère de plus de 34 semaines de gestation en phase de travail actif

Début d'action	Pic d'action	Durée d'action
IV : immédiatement	IV : 5 à 15 minutes	IV : 0,5 à 1 heure

- Administrer IV avec dilution
 - Fentanyl 50 mcg (soit 1 mL) et diluer dans 9 mL de NaCl 0,9%
 - Administrer IV en **2 minutes**
- L'infirmière doit être présente au chevet pour les 20 minutes qui suivent l'administration de la dose IV
- Garder en tout temps une ampoule de **naloxone 0,4 mg/mL au chevet**
- ATTENTION : tenter de ne pas administrer de narcotiques 1 à 2 heures avant la naissance

SURVEILLANCE MATERNELLE (inscription des données sur feuille de surveillance des opiacés)

- Prendre la TA, FC, RR et Sat. avant l'administration de l'opiacé, au pic d'action de l'opiacé et PRN par la suite
- Évaluer l'intensité de la douleur (0 à 10) avant l'administration de l'opiacé, au pic d'action de l'opiacé et PRN par la suite
- Évaluer le degré de sédation et l'état respiratoire selon tableau ci-dessous « Fréquence de la surveillance »

Fréquence de la surveillance IV
○ Avant l'administration ○ Après l'administration : chaque 5 minutes x 3 ○ Chaque 15 minutes x 2

- **Si dépression respiratoire** (Si respiration inférieure à 8/min ou degré de sédation à 4) :
 - Naloxone 0,4 mg IM ou IV STAT (administrer en 15 secondes)

SURVEILLANCE FOETALE

- Monitoring fœtal électronique (MFÉ) continu pendant et 20 minutes suivant l'administration de chaque dose

SOINS ET SURVEILLANCE DU NOUVEAU-NÉ

- FC, RR, saturation, coloration pendant 2 heures suivant la dernière dose de fentanyl :
 - q 15 minutes pour première heure, puis q 1 heure par la suite
- **Si dépression respiratoire : aviser le pédiatre STAT et débiter les manœuvres de réanimation**
 - Au besoin, faire prescrire naloxone sur ordonnance médicale :
 - Si le poids est connu : naloxone 0,1 mg/kg/dose IM
 - Si le poids est inconnu : naloxone 0,3 mg IM

_____ Date et heure (aaaa/mm/jj)

_____ Signature du prescripteur

_____ # permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)