

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom de la mère : _____

AGITATION AIGUE, AGRESSIVITE ET ANXIETE CONTEXTE PSYCHIATRIQUE

Clientèle gériatrique : voir OIPI-793

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____

TRAITEMENT DE L'AGITATION AIGUË OU DE L'AGRESSIVITÉ

ANTIPSYCHOTIQUES	_____ Halopéridol Initiales	☐ 2 mg ou ☐ 5 mg	☐ PO ☐ IM	q 1 h PRN	Max. : 4 doses/24h
	OU				
	_____ Loxapine Initiales	☐ 25 mg ou ☐ 50 mg	☐ PO ☐ IM		
ET					
BENZODIAZÉPINE	_____ Lorazépam Initiales	☐ 1 mg ou ☐ 2 mg	☐ PO ☐ Sublingual ☐ IM		
AJOUTER PRN					
PRÉVENTION REP*	_____ DiphenhydrAMINE Initiales	☐ 12,5 mg ou ☐ 25 mg ou ☐ 50 mg (ajuster selon poids et sévérité des symptômes)	☐ PO ☐ IM		

- Favoriser la loxapine si antécédent de dystonie avec l'halopéridol
- Éviter les benzodiazépines en contexte d'intoxication aux dépresseurs du système nerveux central (benzodiazépines ou autres)
- L'halopéridol et le lorazépam injectables sont compatibles dans la même seringue. Consulter le document [Compatibilité en seringue des médicaments injectables utilisés en santé mentale](#) ou le pharmacien au besoin.
- Consulter au besoin le document [Aide à la décision : Substance chimique à des fins de mesure de contrôle/Liste des médicaments pouvant être utilisés en situation d'agitation ou d'agressivité](#)
- Consulter au besoin la politique [POL-10071 Exercice de la surveillance accrue d'un usager en milieu hospitalier](#)

TRAITEMENT DE L'ANXIÉTÉ

TRAITEMENT ANXIÉTÉ	_____ Quétiapine Initiales	☐ 12,5 mg ou ☐ 25 mg ou ☐ 50 mg	PO q 2 h PRN	Max. : 4 doses/24 h
	OU			
	_____ Lorazépam Initiales	1 mg	PO q 2 h PRN	Max. : 2 doses/24 h

* REP : Réactions extra-pyramidales

_____	_____	_____
Date et heure (aaaa/mm/jj)	Signature du prescripteur	# permis
☐ Envoyé par _____ (init.)	Heure d'envoi : _____	Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)