

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom de la mère : _____

PROPHYLAXIE ADULTE POST EXPOSITION AU VIH

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

INDICATIONS

Si indiqué, un traitement antirétroviral contre le VIH devrait être débuté idéalement **dans les 2 heures** suivant l'événement. Il n'y a cependant pas d'indication de prescrire la thérapie antirétrovirale **plus de 72 heures** après l'exposition (voir référence au verso pour les indications spécifiques).

La trousse VIH couvre les 4 premiers jours. *Compléter le reste du traitement de 28 jours avec la pharmacie communautaire.*

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à un des antirétroviraux

MÉDICATION

Trousse VIH #1

Contient 4 co Biktarvy (bictégravir 50 mg + emtricitabine 200 mg + ténofovir-alafénamide 25 mg)

_____ Bictégravir 50 mg + emtricitabine 200 mg + ténofovir-alafénamide 25 mg (Biktarvy) si Clcr de 30 mL/min et plus
Initiales 1 co DIE

Utilisation non recommandée si Clcr inférieure à 30 mL/min

Insuffisance hépatique légère à modérée : aucun ajustement requis

Insuffisance hépatique sévère : Utilisation non recommandée

Trousse VIH #2 (si le coût du traitement est un enjeu à la prise de prophylaxie)

Contient 8 co Isentress (raltégravir 400 mg) ET 4 co Truvada (emtricitabine 200 mg + ténofovir-disoproxil 300 mg)

_____ Raltégravir (Isentress) 400 mg 1 co BID + si Clcr de 50 mL/min et plus
Initiales Emtricitabine 200 mg + ténofovir disoproxil 300 mg (Truvada) 1 co DIE

_____ Raltégravir (Isentress) 400 mg 1 co BID + Si Clcr entre 30 et 50 mL/min
Initiales Emtricitabine 200 mg + ténofovir-disoproxil 300 mg (Truvada) 1 co q 48 h

Utilisation non recommandée si Clcr inférieure à 30 mL/min

Insuffisance hépatique légère à modérée : aucun ajustement requis pour Isentress, prudence pour Truvada

Insuffisance hépatique sévère : absence de données, prudence pour Isentress et Truvada

SURVEILLANCE

Faire revoir par un microbiologiste dans un délai de 7 jours

_____ Date et heure (aaaa/mm/jj)

_____ Signature du prescripteur

_____ # permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

RÉFÉRENCES

Pour les indications spécifiques de la prophylaxie post exposition, se référer au :

[Guide pour la prophylaxie et le suivi après une exposition au VIH, au VHB et au VHC](#)

- Tableau 6. Indication de la PPE anti-VIH à la suite d'un contact sexuel (p.18)
- Tableau 7. Indication de la PPE anti-VIH lors d'expositions non sexuelles (p.21)
- Tableau 11. Régimes recommandés pour la femme enceinte (p.60)
- ANNEXE 7. Régimes recommandés pour les enfants, nouveau-nés exclus (p.61)

[Aide à la décision post exposition au VIH](#)

[Aide à la décision post exposition à l'hépatite B](#)

Si l'exposition est survenue dans l'un des cas suivants :

1. L'exposé est un enfant (plus de 12 ans ou plus de 40 kg, prescrire le régime pour adulte)
2. L'exposée est enceinte
3. L'exposé a une insuffisance rénale sévère avec clairance de la créatinine **inférieure à 30 mL/min**
4. La source est porteuse d'un virus multi résistant

Consulter [Ligne Consultation-SIDA pour les médecins du Québec](#) (1-800-363-4814 ou 514-849-5520)

PRÉCAUTIONS

- Évaluer également le risque d'avoir contracté les virus d'hépatites B et C, ainsi que toute autre ITSS. Pour connaître les recommandations les plus récentes concernant la PPE anti-VHB, consulter le Protocole d'immunisation du Québec (Vaccin contre l'hépatite B).
- S'assurer également de l'état psychologique de l'utilisateur et de son suivi. .
- Discuter de l'efficacité réelle de la prophylaxie.
- Donner les conseils préventifs aux usagers afin d'éviter la transmission de l'infection dans les 3 mois suivant l'exposition :
 - Éviter tout rapport sexuel ou utiliser le condom.
 - Les femmes doivent éviter de devenir enceinte et s'abstenir d'allaiter.
 - Éviter de donner du sang, sperme, plasma, des organes ou des tissus.
 - En tout temps : Ne pas partager brosse à dent, rasoir, seringue.