Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Québec

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom de la mère : _____

VANCOMYCINE INTRAVEINEUSE
HEMODIALYSE

Poids : _____ kg Taille : _____ cm
Allergies : _____

Indication : Traitement des infections sévères à staphylocoques ou bactéries sensibles à la vancomycine.

☐ Cible thérapeutique visée se situe entre **15 et 20 mg/L** (dosage pré-dialyse)
☐ Première dose à donner en dialyse
☐ Première dose DÉJÀ donnée avant dialyse : passer directement par l'étape 2.
☐ Vancomycine à administrer à chaque dialyse jusqu'au _____ inclusivement.
JJ - MM - AAAA

Dilution : diluer la fiole de 1 g avec 20 mL d'eau stérile

Si poids inférieur à 50 kg :

Étape 1 :
_____ Vancomycine 1000 mg (20 mL) dans 100 mL NaCl 0,9% IV dans les dernières 60 à 90 min de la dialyse pour la 1re dose
Initiales

Étape 2 :
_____ Vancomycine 500 mg (10mL) dans 100 mL NaCl 0,9% IV dans les dernières 60 à 90 min les dialyses suivantes
Initiales

Si poids de 50 à 100 kg :

Étape 1 :
_____ Vancomycine 1500 mg (30 mL) dans 250 mL NaCl 0,9% IV dans les dernières 120 min de la dialyse pour la 1re dose
Initiales

Étape 2 :
_____ Vancomycine 750 mg (15 mL) dans 100 mL NaCl 0,9% IV dans les dernières 60 à 90 min les dialyses suivantes
Initiales

Si poids supérieur à 100 kg (Utiliser le poids ajusté si obésité morbide (IMC supérieur à 40)) :

Étape 1 :
_____ Vancomycine 1500 mg (30 mL) dans 250 mL NaCl 0,9% IV dans les dernières 120 min de la dialyse pour la 1re dose
Initiales

Étape 2 :
_____ Vancomycine 1000 mg (20 mL) dans 100 mL NaCl 0,9% IV dans les dernières 60 à 90 min les dialyses suivantes
Initiales

Autres dosages (cas particuliers, selon néphrologue) :

Étape 1 :
_____ Vancomycine _____ mg IV dans les dernières _____ minutes de la dialyse pour la première dose.
Initiales

Étape 2 :
_____ Vancomycine _____ mg IV dans les dernières _____ minutes les dialyses suivantes.
Initiales

Suivi :

- Faire un dosage de vancomycine pré-dialyse à chaque dialyse pendant la durée du traitement. Dès que 2 dosages consécutifs sont dans la cible visée, diminuer les dosages pré-dialyse à 1 fois par semaine.
- Aviser le médecin si le dosage de vancomycine est inférieur ou supérieur aux cibles prescrites afin que le traitement soit modifié pour la prochaine dialyse.
- L'infusion trop rapide de vancomycine peut entraîner un syndrome de l'homme rouge (Red Man Syndrome).

_____	_____	_____
Date et heure (aaaa/mm/jj)	Signature du médecin	# permis
☐ Envoyé par _____ (init.)	Heure d'envoi : _____	Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)