

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom de la mère : _____

VASOPRESSEURS URGENCE ET SOINS INTENSIFS

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____

Objectif de traitement

Viser et maintenir une TAM (tension artérielle moyenne) supérieure ou égale à 65 mmHg ou _____ mmHg
et/ou TAS (tension artérielle systolique) supérieure à _____ mmHg

1) Norépinéphrine soluté commercial (Dose habituelle 0,01 – 0,5 mcg/kg/min)

Norépinéphrine 4 mg dans 250 mL D5% (16 mcg/mL) (à privilégier pour voie périphérique) **voir tableau simple concentration**

Initiales _____

Norépinéphrine 8 mg dans 250 mL D5% (32 mcg/mL) **voir tableau double concentration**

Initiales _____

Débuter la perfusion à _____ mcg/kg/min, soit _____ mL/h, puis titrer jusqu'à un maximum de _____ mcg/kg/min, soit _____ mL/h.

2) Épinéphrine 1 mg/mL, fiole multidose de 30 mL (Dose habituelle 0,05 – 0,5 mcg/kg/min)

Épinéphrine : ajouter 4 mg (4 mL) dans 250 mL D5% pour un total de 254 mL (16 mcg/mL) **voir tableau simple concentration**

Initiales _____

Épinéphrine : ajouter 8 mg (8 mL) dans 250 mL D5% pour un total de 258 mL (31 mcg/mL) **voir tableau double concentration**

Initiales _____

Débuter la perfusion à _____ mcg/kg/min, soit _____ mL/h, puis titrer jusqu'à un maximum de _____ mcg/kg/min, soit _____ mL/h.

3) Dopamine soluté commercial (Dose habituelle 3 - 20 mcg/kg/min)

Dopamine 400 mg dans 250 mL D5% (1600 mcg/mL) **voir tableau simple concentration**

Initiales _____

Dopamine 800 mg dans 250 mL D5% (3200 mcg/mL) **voir tableau double concentration**

Initiales _____

Débuter la perfusion à _____ mcg/kg/min, soit _____ mL/h, puis titrer jusqu'à un maximum de _____ mcg/kg/min, soit _____ mL/h.

4) Vasopressine 20 unités/mL, fiole de 1 mL ou 2 mL (Dose habituelle 0,01 – 0,04 unités/min)

Vasopressine : ajouter 40 unités (2 mL) dans 100 mL D5% pour un total de 102 mL (0,4 unité/mL) à 6 mL/h (0,04 unités/min ou 2,4 unités/h)

Initiales _____

Surveillance

- Signes vitaux en continu (via moniteur cardiaque) : TAM, TA, fréquence et rythme cardiaque
- Bilan Ingesta/Excreta (I/E) q 1 h
- Surveiller fréquemment tout changement au point d'infusion pour signes d'extravasation
 - Si extravasation, aviser le médecin et suggérer d'utiliser phentolamine

Date et heure (aaaa/mm/jj)

Signature du prescripteur

permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

TABLEAUX SIMPLE CONCENTRATION

Norépinéphrine 1 mg/mL (soluté commercial) 4 mg dans 250 mL D5% (16 mcg/mL)										
SIMPLE CONCENTRATION	Dose (mcg/kg/min)	Poids en kg débit initial (mL/h)								
		- de 65	65 à 69,9	70 à 74,9	75 à 79,9	80 à 84,9	85 à 89,9	90 à 94,9	95 à 99,9	100 et +
	0,01	2	2	3	3	3	3	3	4	4
	0,03	7	7	8	8	9	10	10	11	11
	0,05	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0,07	16	17	18	20	21	22	24	25	26
	0,09	20	22	24	25	27	29	30	32	34
	0,11	25	27	29	31	33	35	37	39	41
	0,13	29	32	34	37	39	41	44	46	49
	0,15	34	37	39	42	45	48	51	53	56
	0,2	45	49	53	56	60	64	68	71	75
	0,3	68	73	79	84	90	96	101	107	113
	0,4	90	98	105	113	120	128	135	143	150
	0,5	113	122	131	141	150	159	169	178	188

Épinéphrine 1 mg/mL, fiole multidose de 30 mL Ajouter 4 mg (4 mL) dans 250 mL D5% (16 mcg/mL)										
SIMPLE CONCENTRATION	Dose (mcg/kg/min)	Poids en kg débit initial (mL/h)								
		- de 65	65 à 69,9	70 à 74,9	75 à 79,9	80 à 84,9	85 à 89,9	90 à 94,9	95 à 99,9	100 et +
	0,05	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0,1	23	24	26	28	30	32	34	36	38
	0,15	34	37	39	42	45	48	51	53	56
	0,2	45	49	53	56	60	64	68	71	75
	0,25	56	61	66	70	75	80	84	89	94
	0,3	68	73	79	84	90	96	101	107	113
	0,35	79	85	92	98	105	112	118	125	131
	0,4	90	98	105	113	120	128	135	143	150
	0,45	101	110	118	127	135	143	152	160	169
	0,5	113	122	131	141	150	159	169	178	188

Dopamine (soluté commercial) 400 mg dans 250 mL (1600 mcg/mL)										
SIMPLE CONCENTRATION	Dose (mcg/kg/min)	Poids en kg débit initial (mL/h)								
		- de 65	65 à 69,9	70 à 74,9	75 à 79,9	80 à 84,9	85 à 89,9	90 à 94,9	95 à 99,9	100 et +
	3	7	7	8	8	9	10	10	11	11
	4	9	10	11	11	12	13	14	14	15
	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	16	17	18	20	21	22	24	25	26
	10	23	24	26	28	30	32	34	36	38
	12	27	29	32	34	36	38	41	43	45
	15	34	37	39	42	45	48	51	53	56
	17	38	41	45	48	51	54	57	61	64
	20	45	49	53	56	60	64	68	71	75

TABLEAUX DOUBLE CONCENTRATION

Norépinéphrine 1 mg/mL (soluté commercial) 8 mg dans 250 mL D5% (32 mcg/mL)										
DOUBLE CONCENTRATION	Dose (mcg/kg/min)	Poids en kg débit initial (mL/h)								
		- de 65	65 à 69,9	70 à 74,9	75 à 79,9	80 à 84,9	85 à 89,9	90 à 94,9	95 à 99,9	100 et +
	0,01	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	0,03	3	4	4	4	5	5	5	5	6
	0,05	6	6	7	7	8	8	8	9	9
	0,07	8	9	9	10	11	11	12	12	13
	0,09	10	11	12	13	14	14	15	16	17
	0,11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	0,13	15	16	17	18	20	21	22	23	24
	0,15	17	18	20	21	23	24	25	27	28
	0,2	23	24	26	28	30	32	34	36	38
	0,3	34	37	39	42	45	48	51	53	56
	0,4	45	49	53	56	60	64	68	71	75
	0,5	56	61	66	70	75	80	84	89	94

Épinéphrine 1 mg/mL, fiole multidose de 30 mL Ajouter 8 mg (8 mL) dans 250 mL D5% (31 mcg/mL)										
DOUBLE CONCENTRATION	Dose (mcg/kg/min)	Poids en kg débit initial (mL/h)								
		- de 65	65 à 69,9	70 à 74,9	75 à 79,9	80 à 84,9	85 à 89,9	90 à 94,9	95 à 99,9	100 et +
	0,05	6	6	7	7	8	8	9	9	10
	0,1	12	13	13	15	15	16	17	18	19
	0,15	17	19	20	22	23	25	26	28	29
	0,2	23	25	27	29	31	33	35	37	39
	0,25	29	31	33	36	39	41	44	46	48
	0,3	35	38	41	44	46	49	52	55	58
	0,35	41	44	47	51	54	58	61	64	68
	0,4	46	50	54	58	62	66	70	74	77
	0,45	52	57	61	65	70	74	78	83	87
	0,5	58	63	68	73	77	82	87	92	97

Dopamine (soluté commercial) 800 mg dans 250 mL (3200 mcg/mL)										
DOUBLE CONCENTRATION	Dose (mcg/kg/min)	Poids en kg débit initial (mL/h)								
		- de 65	65 à 69,9	70 à 74,9	75 à 79,9	80 à 84,9	85 à 89,9	90 à 94,9	95 à 99,9	100 et +
	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
	4	5	5	5	6	6	6	7	7	8
	5	6	6	7	7	8	8	8	9	9
	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23
	15	17	18	20	21	23	24	25	27	28
	17	19	21	22	24	26	27	29	30	32
	20	23	24	26	28	30	32	34	36	38