

Installation : _____

Dossier : _____
Nom, Prénom : _____
Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ
NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM
Nom, Prénom de la mère : _____

ACYCLOVIR INTRA VEINEUX

Poids : _____ kg Taille : _____ cm IMC : _____ kg/m ² si supérieur à 30 kg/m ² utiliser le Poids de dosage = _____ kg Poids dosage = poids idéal + [0,4 X (poids actuel – poids idéal)] Homme : poids idéal (kg) = 50 + [0,9 X (taille (cm) – 152)] Femme : poids idéal (kg) = 45,5 + [0,9 X (taille (cm) – 152)] On peut aussi utiliser le lien www.globalrph.com/ibw_calc.htm pour accéder à un calculateur en ligne gratuit.	Fonction rénale estimée : _____ mL/min (Le résultat selon CKD-EPI du laboratoire peut être utilisé mais attention de le corriger en fonction de la surface corporelle de l'usager)
---	--

Posologie (encéphalite herpétique ou à VZV, zona disséminé ou varicelle chez hôte immunosupprimé)

HD : hémodialyse DPAC : dialyse péritonéale ambulatoire chronique

_____ Acyclovir 10 mg/kg, soit _____ mg IV q 8 h	Si ClCr supérieure à 50 mL/min	Diluer dans 250 mL de NaCl 0,9% Administer en 1 h 30 min
Initiales _____		
_____ Acyclovir 10 mg/kg, soit _____ mg IV q 12 h	Si ClCr de 25 à 50 mL/min	
Initiales _____		
_____ Acyclovir 10 mg/kg, soit _____ mg IV q 24 h	Si ClCr de 10 à 24 mL/min	
Initiales _____		
_____ Acyclovir 5 mg/kg, soit _____ mg IV q 24 h	Si ClCr inférieure à 10 mL/min, HD, DPAC	
Initiales _____	Administer après la dialyse si HD ou DPAC	

Autre posologie

_____ Acyclovir _____ mg/Kg, soit _____ mg IV q _____ h

Initiales _____

Analyses

FSC, profil rénal, magnésémie initialement puis q 24 h X 3

Hydratation

L'acyclovir injectable peut entraîner une insuffisance rénale aiguë par cristallisation tubulaire. Il est primordial d'hydrater adéquatement l'usager lors de son administration.

_____ NaCl 0,9% débit à _____ mL/h (recommandons **1 mL/kg/h** minimum)

Initiales _____

_____ D5% NaCl 0,45% débit à _____ mL/h (recommandons **1 mL/kg/h** minimum)

Initiales _____

_____ Restriction liquidienne : pas de soluté mais administrer 250 mL de NaCl 0,9% en 1 h avant chaque dose d'acyclovir.

Initiales _____

Autre : _____

Protection rénale

En cas d'insuffisance rénale aiguë établie ou possible, suspendre IECA, ARA, AINS et réviser la posologie des diurétiques.
Éviter si possible l'association de médicaments néphrotoxiques.

Médicaments à modifier : _____

_____	_____	_____
Date et heure (aaaa/mm/jj)	Signature du prescripteur	# permis
☐ Envoyé par _____ (init.)	Heure d'envoi : _____	Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)