

Installation : _____

Dossier : _____
Nom, Prénom : _____
Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ
NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM
Nom, Prénom de la mère : _____

CONDUITE POUR LA PRISE DE MEDICAMENTS USAGER EXTERNE EN PRÉ ET POST-OPÉRATOIRE

Poids : _____ kg Taille : _____ cm
Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

INDICATIONS

Cesser les produits de santé naturels 14 jours avant la chirurgie

Le matin de la chirurgie prendre les médicaments avec un peu d'eau selon les consignes suivantes :

- ☐ Poursuivre la médication habituelle sauf les médicaments mentionnés plus bas
- ☐ Prendre aucun médicament le matin de la chirurgie
- ☐ Ne prendre que les médicaments suivants : _____

MÉDICAMENTS

Antiplaquettaire ou anti-inflammatoire

- ☐ Acide acétylsalicylique (Aspirine)
 - Cesser _____ jours **avant** la chirurgie. Dernière dose à prendre le _____
 - Reprendre _____ jours **après** la chirurgie. Reprendre le _____
- ☐ Clopidogrel (Plavix) ☐ prasugrel (Effient) ☐ ticagrelor (Brilinta)
 - Cesser _____ jours **avant** la chirurgie. Dernière dose à prendre le _____
 - Reprendre _____ jours **après** la chirurgie. Reprendre le _____
 - Posologie lors de la reprise _____
- ☐ Cesser les anti-inflammatoires (_____) _____ jours **avant** et reprendre _____ jours **après**

Anticoagulant

- ☐ Apixaban (Éliquis) ☐ dabigatran (Pradaxa) ☐ edoxaban (Lixiana) ☐ rivaroxaban (Xarelto)
 - Cesser _____ jours **avant** la chirurgie. Dernière dose à prendre le _____
 - Reprendre _____ jours **après** la chirurgie. Reprendre le _____
- ☐ Warfarine (Coumadin) : suivre les indications jointes séparément

Hypertension et cardiologie

- ☐ Poursuivre la médication suivante : _____
- ☐ Éviter de prendre _____ le matin de la chirurgie
- ☐ Suspendre _____ pour _____ jours **après** la chirurgie

Diabète

- ☐ Canagliflozine (Invokana) ☐ dapagliflozine (Forxiga) ☐ empagliflozine (Jardiance)
 - ☐ Cesser le **matin** de la chirurgie **OU** ☐ Cesser _____ jours **avant** la chirurgie
 - Reprendre _____ jours **après** la chirurgie
- ☐ Le matin de la chirurgie ne pas prendre :
 - ☐ gliclazide (Diamicon) ☐ glyburide (Diabeta) ☐ metformine (Glucophage) ☐ répaglinide (Gluconorm)
 - ☐ alogliptine (Nesina) ☐ linagliptine (Trajenta) ☐ saxagliptine (Onglyza) ☐ sitagliptine (Januvia)
 - ☐ Autre : _____
- ☐ Diminuer votre insuline la veille _____
- ☐ Diminuer votre insuline _____ le matin de la chirurgie
- ☐ Ne pas prendre votre insuline _____ le matin de la chirurgie

Autres recommandations

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)