

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom, Prénom de la mère : _____

INTUBATION A SEQUENCE RAPIDE

Poids : _____ kg

Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

PRÉPARATION INFIRMIÈRE / INHALOTHÉRAPEUTE

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ☐ Moniteur | ☐ Capnographe | ☐ Laryngoscope et lame | ☐ Plan B : _____ |
| ☐ Saturomètre | ☐ Ballonnet vérifié | ☐ Vidéo-laryngoscopie | Position : ☐ Alèse |
| ☐ Ballon-masque | ☐ Stylet | ☐ Vasopresseur | ☐ Oreiller |

PRÉOXYGÉRATION

TEMPS = -5 minutes

- ☐ O₂ 100% (sans assistance) ☐ Lunette nasale haut débit 15 L/min ☐ VNI ou Ballon-masque si saturation inférieure à 90%

PRÉTRAITEMENT (PRN)

TEMPS = -3 minutes

_____ Fentanyl 2 à 3 mcg/kg soit : _____ mcg IV

Initiales _____

INDUCTION

TEMPS = -2 minutes

_____ Midazolam 0,1 à 0,2 mg/kg soit : _____ mg IV

Initiales _____

TEMPS = 0 à +5 minutes

_____ Kétamine 1 à 2 mg/kg soit : _____ mg IV

Initiales _____

_____ Étomidate 0,3 mg/kg soit : _____ mg IV

Initiales _____

_____ Propofol 2 à 2,5 mg/kg soit : _____ mg IV

Initiales _____

CURARISATION

TEMPS = 0

_____ Succinylcholine 1 à 1,5 mg/kg soit : _____ mg IV

Initiales _____


_____ Rocuronium 0,6 à 1 mg/kg soit : _____ mg IV

Initiales _____

HYPOTENSION

			Heure HH : MM	Heure HH : MM	Heure HH : MM	Heure HH : MM	Heure HH : MM
Initiales _____	Phényléphrine IV	Seringue commerciale 50 mcg/mL (10 mL) Dose : 50 mcg à 200 mcg q 1 à 5 min (Dose max cumulative 200 mg)	_____ mcg	_____ mcg	_____ mcg	_____ mcg	_____ mcg
Initiales _____	ÉPHEDrine IV	Concentration finale : 5 mg/mL 50 mg dans un total de 10 mL de NaCl 0,9% Dose : 5 à 25 mg q 5 à 10 min (Dose max cumulative 50 mg)	_____ mg	_____ mg	_____ mg	_____ mg	_____ mg

Classification de Cormack-Lehane



_____ Date et heure (aaaa/mm/jj)

_____ Signature du prescripteur

_____ # permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

INTUBATION A SEQUENCE RAPIDE (SUITE)

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom, Prénom de la mère : _____

INTUBATION TEMPS « 0 » (SELICK PRN)

TEMPS = +45 à 60 secondes

Tube N° _____ Fixé à _____ cm
Nombre de tentatives : _____ Grade d'intubation 1 2 3 4 Lame : _____

CONFIRMATION DU TUBE ENDOTRACHÉAL

TEMPS = +60 secondes

☐ Capnographe ☐ Auscultation ☐ Fast-écho ☐ Rx poumons

PLAN B

☐ Bougie ☐ Masque laryngé ☐ Trachéotomie ☐ Consultation anesthésie
☐ Vidéo-laryngoscope ☐ Fibroscope ☐ Crico / Jet ventilation ☐ _____

PARAMÈTRES RESPIRATOIRES

Mode ventilatoire : _____
FiO₂ : _____ % Fréquence : _____ /min Volume : _____ mL
PEEP : _____ cmH₂O PSV : _____ mmHg

_____	_____	_____
Date et heure (aaaa/mm/jj)	Signature du prescripteur	# permis
☐ Envoyé par _____ (init.)	Heure d'envoi : _____	Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

ANNEXE

DOSAGE DES MÉDICAMENTS EN FONCTION DU POIDS ¹													
Médicament et dose IV	Poids (kg)												
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100 et plus
PRÉTRAITEMENT (dose en mcg)													
Fentanyl 2 mcg/kg	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Fentanyl 3 mcg/kg	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
INDUCTION (dose en mg)													
Midazolam 0,1 mg/kg	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Midazolam 0,2 mg/kg	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kétamine 1 mg/kg	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Kétamine 2 mg/kg	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Étomidate 0,3 mg/kg	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30
Propofol 2 mg/kg	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Propofol 2,5 mg/kg	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	182,5	200	212,5	225	237,5	250
CURARISATION (dose en mg)													
Succinylcholine 1 mg/kg	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Succinylcholine 1,5 mg/kg	60	70	75	85	90	100	105	115	120	130	135	145	150
Rocuronium 0,6 mg/kg	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Rocuronium 1 mg/kg	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

¹Les doses de médicaments doivent toujours être adaptées à la situation clinique de l'utilisateur (hémodynamie, obésité, consommation d'alcool, etc.)