



RXvigilance

L'INDISPENSABLE
outil d'aide à la décision en
pharmacothérapie

Formation vidéo [disponible ici](#)



RXvigilance

PARFAITEMENT ADAPTÉE
AUX BESOINS DES
PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ DE 1^{RE} LIGNE

- ▶ Médecins
- ▶ Pharmaciens
- ▶ Infirmières
- ▶ Inhalothérapeutes
- ▶ Autres professionnel·le·s de la santé

L'ASSISTANT IDÉAL EN MATIÈRE DE TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE

Informations sur
les **médicaments**
et les **maladies**

Outils cliniques variés
(calculs, dosages
pédiatriques, etc.)




Moteur d'analyse
générant entre
autres des alertes

**Informations pour
les patients** sur les
médicaments et maladies



RXvigilance

- INFORMATION
fiable et à jour
- PRÉSENTATION
claire et concise
- NAVIGATION
rapide et conviviale



Outil d'aide à la
décision clinique

- DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

1 600

MONOGRAPHIES synthétisées

20

OUTILS de calcul

2 600

FICHES d'interactions

100


TABLEAUX comparatifs

3 000

FEUILLETS D'INFORMATION
pour les patient·e·s

LES OUTILS ESSENTIELS

MÉDICAMENTS	OUTILS DYNAMIQUES	INFORMATION PUBLIQUE
▶ Antibiothérapie ▶ Bibliothèque professionnelle ▶ Magistrales ▶ Produits naturels ▶ Tableaux comparatifs	▶ Éditeur de profil (Nouveau!) ▶ Documentation professionnelle ▶ Dosages pédiatriques ▶ Information et couverture ▶ Outils de calcul	▶ Calendriers de prise ▶ Feuillet d'information ▶ Pictogrammes posologiques ▶ Santé-voyage ▶ Tests de laboratoire



RXvigilance

EN DÉTAILS

MENU D'ACCUEIL

Recherche
puissante
et intuitive

**RXvigilance**
Version complète - par Vigilance Santé

English | Aide |   

COVID-19 - Informations utiles et vaccination

Janvier 2021

Recherche



Nouveaux produits commerciaux

NIFEREX	150MG	CAPSULE
ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC		TROUSSE
TEVA BETAM. CALCIPOTRIOL	500+50MCG/G	POMMADE
TARO FAMPRIDINE	10MG	COMPRIME-12H
OSNUVO	250MCG/ML	INJ.CARTOUC.
IBSRELA	50MG	COMPRIME
INQOVI	35+100MG	COMPRIME



Médicaments
Antibiothérapie
Bibliothèque professionnelle
Magistrales
Produits naturels
Tableaux comparatifs

Outils dynamiques
Éditeur de profil
Éditeur de profil (Nouveau!)
Documentation professionnelle
Dosages pédiatriques
Information et couverture
Outils de calcul

Information publique
Calendriers de prise
Feuillets d'information
Pictogrammes posologiques
Santé-voyage
Tests de laboratoire

**RXvigilance**
Version complète - par Vigilance Santé

English | Aide |   

COVID-19 - Informations utiles et vaccination

Janvier 2021

Recherche

Pour les professionnels 7 résultats trouvés

 Monographies (1)
clarithromycine

 Tableaux comparatifs (1)
macrolides et agents apparentés

Pour les patients 5 résultats trouvés

Feuillets médicament (5)
biaxin 125mg/5ml suspension
biaxin 250mg/5ml suspension
biaxin bid 250mg comprimé
biaxin bid 500mg comprimé
biaxin xl 500mg comprimé-24h

MONOGRAPHIES

- Plus de 1600 monographies rédigées par notre équipe de pharmaciens
- Hyperliens pour navigation fluide
- Toute l'information aux bouts des doigts

clarithromycine (Biaxin)

Des produits combinés sont également disponibles au Canada :

- [clarithromycine + amoxicilline + lansoprazole](#)

- Macrolide bactériostatique
- Métabolites actifs
- Se concentre dans les poumons

Posologie usuelle : **BIAXIN :**
prendre 1 dose 2 fois par jour - déjeuner et souper (infection)

BIAXIN XL :
prendre 1 dose 1 fois par jour lors d'un repas (infection)

Tableau comparatif :  [Macrolides et agents apparentés](#)

Table de prix :  [Macrolides et agents apparentés](#)

Spectre :  [Clarithromycine](#)

Monographie : 426

Codification :	Type de code	Code	Nom
	Vigilance Santé	08121209	Clarithromycine (MACROLIDES)
	AHFS	08:12.12.92	Autres macrolides
	ATC	J01FA09	Clarithromycine

Documentation

[Pour les professionnels \(2\)](#) [Pour les patients \(2\)](#)

[endocardite bactérienne](#)

[guide d'usage optimal - INESSS - antibioprophylaxie de l'endocardite bactérienne](#)

Monographies des fabricants

[biaxin](#)

[biaxin bid](#)

[biaxin xl](#)

[ran clarithromycin xl](#)

Avis et mises en garde

FDA - 22 février 2018

Généralités

Documentation

Avis et mises en garde

Effets secondaires

Indications et doses

Dose adulte

Dose pédiatrique

Dose gériatrique

Insuffisance rénale

Insuffisance hépatique

Supplément en dialyse

Précautions

Grossesse

Allaitement

Verres de contact et vue

Attention particulière

Nourriture

Surveillance de la thérapie

Mises en garde

Pharmacocinétique

Allergies croisées

Interactions

Voies métaboliques et transporteurs

Produits disponibles

Notes

Références

Haut de page



MONOGRAPHIES DES FABRICANTS CANADIENS

- Plus de 2000 monographies disponibles par l'intermédiaire
 - Monographies de produits
 - Résultat de recherche
- Français et anglais
- Toujours à jour

**Paroxétine**
MONOGRAPHIE

paroxétine (Paxil)



Ce médicament a un effet sur la **reproduction** chez les femmes enceintes. Des précautions sont recommandées pour les travailleurs de la santé. Voir les informations particulières à ad.

- Antidépresseur
- Inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine

Posologie usuelle : prendre 1 comprimé 1 à 2 fois par jour, avec ou sans nourriture.

Tableau comparatif :  Antidépresseur

Table de prix :  Antidépresseur

Monographie : 537

Codification :

Type de médicament	Antidépresseur
Vigilance	Non
AHFS	16.04.01
ATC	N06AB01

Documentation 

Pour les professionnels (4) [Pour les patients](#)

[guide clinique - INSPQ - faire face à la dépression](#)

[guides cliniques - RUSHGQ - gestion de la dépression](#)

[outil clinique - INESSS - questionnaire de dépression](#)

[protocole médical - INESSS - ajustement du traitement](#)

Monographies des fabricants

- [paxil](#)
- [paxil cr](#)

MONOGRAPHIE DE PRODUIT

P^rPAXIL

Comprimés de paroxétine USP

10, 20 ou 30 mg de paroxétine (sous forme de chlorhydrate de paroxétine)

Antidépresseur, antiobsessionnel, antipanique, anxiolytique, traitement de la phobie sociale et traitement de l'état de stress post-traumatique

GlaxoSmithKline Inc.
7333 Mississauga Road
Mississauga (Ontario)
L5N 6L4

Date de révision :
18 juin 2020

N° de contrôle : 237146

©2020 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.
Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

Avis et mises en garde

Santé Canada - Mai 2004 et Juin 2004

Des analyses sur l'innocuité des ISRS et d'autres antidépresseurs récents semblent indiquer que l'emploi de ces médicaments chez les moins de 18 ans peut être associé à des modifications comportementales et émotionnelles.

PLUS DE 100 TABLEAUX COMPARATIFS



Médicaments utilisés dans le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique

Bronchodilatateurs à courte durée d'action (BDCA) (abréviations)

Produits	Noms commerciaux	Formes disponibles	Dose a (mcg/c)
bêta-2-agonistes à courte durée d'			
salbutamol	Airomir, Ventolin HFA et Diskus	AD / NEB / IPS	100-2
terbutaline	Bricanyl Turbuhaler	IPS	500-1
antimuscarinique à courte durée d'			
ipratropium	Atrovent HFA	AD / NEB	40-4

Combinaisons BDCA (abréviations)

Noms commerciaux Produits combinés	Antimuscarinique	Bêta-2-agonistes	Forme disponible
Combivent Respimat, UDV	ipratropium	salbutamol	IBL / M
Duovent UDV	ipratropium	fénotérol	NE

Bronchodilatateurs à longue durée d'action (BDLA) (abréviations)

Produits	Noms commerciaux	Formes disponibles	
bêta-2-agonistes à longue durée d'			
formotérol	Foradil Aerolizer	IPS	
indacatérol	Onbrez Breezhaler	IPS	
salmétérol	Serevent Diskus	IPS	
antimuscariniques à longue durée d'			
acéclidinium	Tudorza Genuair	IPS	
glycopyrronium	Seebri Breezhaler	IPS	
tiotropium	Spiriva Handihaler et Respimat	IBL / IPS	
umécridinium	Incruse Ellipta	IPS	

Combinaisons AMLA+BALA (abréviations)

Noms commerciaux Produits combinés	Antimuscariniques	Bêta-2-agonistes
Anoro Ellipta	umécridinium	vilantérol
Duaklir Genuair	acéclidinium	formotérol
Inspiroto Respimat	tiotropium	olodatérol
Ultibro Breezhaler	glycopyrronium	indacatérol

Combinaisons BALA+CSI (abréviations)



Les antidépresseurs

Produits	Nom commercial	Dose orale 🚩	Dose équiv.	Horaire de prise	Effets secondaires					Diminue recaptage		
		mg/jour	mg/jour		anticholinergique	sédatif	tachycardie	trouble sexuel	Gain de poids (> 6 kg)	5-HT	DOPA	NE
Antipsychotique Atypique												
quétiapine (forme XR)	Seroquel XR	150-300		DIE	++++	++++	+++	++++	+++			
Antagoniste du récepteur NMDA												
eskétamine	Spravato	28-84 (intranasal)		aux 3-14 jours	++	+++	++					
Inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)												
phénelzine	Nardil	45-90	15	TID	++++	+++	+++	++++	+++			
tranylcypromine	Parnate	20-60	10	BID-TID	+++	+++	+++	++	++			
Inhibiteur du recaptage de la norépinéphrine et de la dopamine (IRND)												
bupropion	Wellbutrin	150-300	150	AM-BID	+++	++	++	●	+	-	++	+
Inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine (IRSN)												
desvenlafaxine	Pristiq	50-100	50	DIE	+++	+++	++	++		+++	+	+
duloxétine	Cymbalta	60-120		DIE	+++	+++	++	++++	++	++++	++	++++
lévomilnacipran	Fetzima	40-120		DIE	++		++	++		+++		+++
venlafaxine	Effexor XR	75-375	50	DIE	+++	+++	++	++++	++	+++	+	+
Inhibiteur du recaptage de la sérotonine et agoniste partiel des récepteurs 5-HT1A												
vilazodone	Viibryd	10-40	20	DIE	+	+	+	+	+	+++++	+++	+++
Inhibiteur du recaptage de la sérotonine et antagoniste des récepteurs 5-HT2												
trazodone	Desyrel	150-600	100	TID	+++	++++	++	+	++	++	-	-
Inhibiteur réversible de la monoamine oxydase-A (IRMA)												
moclobémide	Manerix	300-600	150	BID	+++	++	++	++	+			
Inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS)												
citalopram	Celexa	10-40	10	DIE	+++	+++	++	++++	++	++++	-	+
escitalopram	Ciprallex	10-20	2.5-5	DIE	+++	++	++	+++	+	++++	-	+
fluoxétine	Prozac	10-80	10	AM-BID	+++	+++	+	++++	++	++++	+	++
fluvoxamine	Luvox	50-300	25-50	HS-BID	+++	+++	+	++++	++	++++	-	++
paroxétine	Paxil	10-50	10	DIE	+++	+++	++	++++	+++	+++++	++	+++
sertraline	Zoloft	50-200	25	DIE	+++	+++	++	++++	++	+++++	+++	++



Les relaxants musculaires

Produits	Nom Commercial	Action	
		début minutes	durée heure
baclofène ¹	Lioresal	60	
chlorzoxazone + acétaminophène	Parafon	60	6
cyclobenzaprine ²	Flexeril	60	12-24

[Protocole médical de l'INESSS](#)
[Protocole de soins de l'INSPQ](#)

4-6
3-6
losquelettiques

AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE

- Guide d'antibiothérapie, spectre antimicrobien, etc.
- Liens vers de la documentation professionnelle à portée de main
 - Lignes directrices
 - Guides cliniques
 - Algorithmes décisionnels
 - Et plus encore

MÉDICATION INHALÉE ET DISPOSITIFS D'INHALATION

BRONCHODILATEURS

AGONISTES BETA-2 À COURTE DURÉE D'ACTION

Salbutamol (sulfate)

Terbutaline (sulfate)

AGONISTES BETA-2 À LONGUE DURÉE D'ACTION

Indacatérol (malate)

Salmétérol (oxalate)

AIROMIR Aerosol-doseur 100 mcg

VENTOLIN HFA Aerosol-doseur 100 mcg

VENTOLIN Turbuhaler 200 mcg

BRICANYL Turbuhaler 0.5 mg

FORADIL Aerosol 12 mcg

OXEZE Turbuhaler 6 mcg

OXEZE Turbuhaler 12 mcg

ONBREZ Diskus 75 mcg

SEREVENT Diskus 50 mcg

ANTICHOLINERGIQUE À COURTE DURÉE D'ACTION

Ipratropium (bromure)

ANTICHOLINERGIQUES À LONGUE DURÉE D'ACTION

Acélinium (bromure)

Glycopyrronium (bromure)

Tiotropium (bromure)

Umécridinium (bromure)

ATROVENT HFA Aerosol-doseur 20 mcg

CORTICOS

Béclométhasone (propionate)

QVAR Aerosol-doseur 50 mcg

QVAR Aerosol-doseur 100 mcg

FLUTICASONE (propionate)

FLOVENT HFA Aerosol-doseur 50 mcg

FLOVENT HFA Aerosol-doseur 125 mcg

ASSOCIATION

CORTICOSTÉROÏDES / AGONISTES BETA-2

Budésonide / Formotérol (fumarate)

SYMBICORT Turbuhaler 100/6 mcg

SYMBICORT Turbuhaler 200/6 mcg

MOMÉTASONE (furoate)

Formotérol (fumarate)

ZENHALE Aerosol-doseur 100/5 mcg

ZENHALE Aerosol-doseur 200/5 mcg

DUAKLIR Genuair 400/12 mcg

ULTIBRO Breechaler 500/10 mcg

INSPILTO Respimat 2,5/2,5 mcg

ANORO Elipta 62,5/25 mcg

COMBIVENT Respimat 20/100 mcg

Reliever on Demand

All individuals with asthma should have a reliever for as needed use.

- SABAs are appropriate relievers for all age groups and severity.
- SABAs are the preferred class of reliever for mild asthma.
- In individuals 12 years of age and over, BUD/FORM combination may be considered:
 - as a reliever in individuals with moderate asthma and poor control despite fixed-dose maintenance ICS/LABA combination;
 - as a reliever and a controller in a single inhaler for exacerbation-prone individuals with uncontrolled asthma despite high maintenance doses of ICS or ICS/LABA combination therapy.

Controller Therapy

Regular controller therapy is indicated in individuals who have one or more indicators of poor control.

Pharmacologic therapy should be determined based upon an individual's current asthma control, escalated if needed to gain control, only after addressing other reasons for poor control, and reduced to the least amount required to maintain asthma control.

Prescribed controller therapy should take into account both current control and future risk for severe exacerbations.

ICSs are the first-line controller therapy for all ages

In preschoolers, low-dose ICSs are first-line therapy.

PRODUCT (Trade Name)	Pediatric Daily ICS Dose (mcg) (6 to 11 years of age)			Adolescent and Adult Daily ICS Dose (mcg) (12 years of age and over)		
	LOW	MEDIUM	HIGH	LOW	MEDIUM	HIGH
Béclométhasone dipropionate HFA (QVAR)	<100	201-400*	>400*	<250	251-500	>500
Budésonide* (Pulmicort® Turbuhaler®)	<400	401-800	>800	<400	401-800	>800
Ciclesonide* (Wixela®)	<200	201-400*	>400*	<200	201-400	>400
Fluticasone propionate (Flovent® MDI and Flovent® Diskus®)	<200	201-400	>400*	<250	251-500	>500
Fluticasone furoate* (Airclear® Turbuhaler®)	N/A	N/A	N/A	100		200
Mometasone furoate* (Nasonex® Turbuhaler®)	100	>200-400	>400*	100-200	>200-400	>400

NOTE: Dosing categories are approximate, based on a combination of approximate dose equivalency as well as safety and efficacy data rather than available product formulations. *Licensed for once daily dosing in Canada (i.e. Daily doses of béclométhasone dipropionate HFA-200 mcg/day, ciclesonide >200 mcg/day are not approved for children under age 12 years in Canada, and fluticasone >400 mcg/day is not approved for children under the age of 16 years in Canada (highlighted)).

Adjunct Controller Therapy

Adjunct controller therapy is indicated if asthma cannot be controlled on ICS (or alternatively, on LTRA).

- The Asthma Management Continuum diagram outlines which adjunct therapy should be considered at what ICS dosing category for children 6 years of age and over, adolescents, and adults.
- LABAs are not indicated in preschoolers.
- LABAs should never be used alone (as monotherapy) for asthma.
- LABAs should only be used as add-on therapy to an ICS (ideally in the same inhaler device).
- High doses of ICS may be associated with significant side effects and should only be prescribed by asthma specialists.

Written Action Plan

Written action plans are a key component of care for all ages.

An action plan should outline:

- Daily preventive management to maintain control;
- When and how to adjust reliever and controller therapy for loss of control;
- Clear instructions regarding when to seek urgent medical attention.

Adherence to maintenance ("green zone") therapy is a fundamental component of written action plans.

Maintenance therapy	Recommended controller step-up therapy for the Action Plan "Yellow zone"	
	1st choice	2nd choice
Preschoolers (under 6 years) and children (6-11 years)		
No maintenance	None	Consider starting regular controller therapy
ICS	None	Prednisone/prednisolone 1 mg/kg x 3-5 days*
ICS/LABA†	None	Prednisone/prednisolone 1 mg/kg x 3-5 days*
Adolescents and Adults (12 years and over)		
No maintenance	None	Consider starting regular controller therapy
ICS	Trial of ≥4-fold ↑ in ICS for 7-14 days**	Prednisone 30-50 mg for at least 5 days*
ICS/LABA	Increase BUD/FORM to max 4 inh bid x 7-14 days OR BUD/FORM as a reliever and a controller (max 8 inh/day)	Prednisone 30-50 mg for at least 5 days
FF/SALM or MOM/FORM or FFV	Trial of ≥4-fold ↑ in ICS (higher ICS strength of ICS/LABA combination or with ICS) for 7-14 days**	Prednisone 30-50 mg for at least 5 days**

* In children with a recent history of severe exacerbation and suboptimal response to SABA during index exacerbation. † Does not apply to preschoolers. ** In individuals ≥15 years of age with a history of severe acute loss of asthma control in the preceding year.

Definition of abbreviations and terms

FEV₁: Forced expiratory volume in 1 second; FVC: Forced vital capacity; PEF: Peak expiratory flow; PC₂₀: Proactive concentration of methacholine producing a 20% fall in FEV₁; Diurnal variation: is calculated as the highest PEF minus the lowest divided by the highest PEF multiplied by 100 for morning and night (determined over a 1-2 week period); BUD/FORM: Budesonide/Formoterol; FF/SALM: Fluticasone propionate/salmeterol; FFV: Fluticasone furoate/vilanterol; MOM: Mometasone; ICS: Inhaled Corticosteroid; LABA: Long-acting beta₂-agonist; LTRA: Leukotriene receptor antagonist; SABA: Short-acting beta₂-agonist.

Bibliography

Loughheed MD, Lemire C, Ducharme F, et al. Canadian Thoracic Society 2015 guideline update: Diagnosis and management of asthma in preschoolers, children and adults. *Can Respir J* 2012; Vol 19(2): 127-64.

Ducharme FM, Dell SD, Radhakrishnan D, et al. Diagnosis and management of asthma in preschoolers. A Canadian Thoracic Society and Canadian Pediatric Society position paper. *Can Respir J* 2015; 22(3): 135-143.

FitzGerald JM, Lemire C, Loughheed MD, et al. Recognition and management of severe asthma: A Canadian Thoracic Society position statement. *Canadian Journal of Respiratory, Critical Care, and Sleep Medicine* 2017; 1(4): 199-221.

CANADIAN THORACIC SOCIETY

30 Concourse Gate, Unit 27
Ottawa, Ontario K2E 7V7
613-235-8550 cts-sct.ca

Asthma
Achieve control and prevent future risk

Également disponible en français
5-105-03-2018

AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE

 Antibiothérapie Cellulite	
Traitement chez l'adulte	
• Amoxicilline/Clavulanate (Clavulin)	500 mg TID ou 87
• Azithromycine (Zithromax)	500 mg STAT puis
■ Céfadroxil (Duricef)	500 mg BID/1000
• Céfazoline (Kefzol)	1 à 2 g IV TID
• Ceftriaxone (Rocephin)	1 à 2 g IV DIE
■ Céphalexine (Keflex)	500-1000 mg QID
• Clarithromycine (Biaxin)	250 à 500 mg BID
■ Clindamycine (Dalacin)	150 à 450 mg TID
• Cloxacilline (Orbénine)	250 à 500 mg QID
• Erythromycine-Base	250 mg QID
• Levofloxacin (Levaquin)	500 mg DIE
• Moxifloxacin (Avelox)	400 mg DIE
■ = premier choix de traitement	
Traitement chez l'enfant	
• Amoxicilline (Amoxil)	50 mg/kg/jour (TID)
• Amoxicilline/Clavulanate (Clavulin)	40 mg/kg/jour (TID)
• Amoxicilline/Clavulanate (Clavulin)	45 mg/kg/jour (BID)
• Céfadroxil (Duricef)	30 mg/kg/jour (BID)
• Céfazoline (Kefzol)	50 à 100 mg/kg/jour
■ Céphalexine (Keflex)	25 à 100 mg/kg/jour
• Clindamycine (Dalacin)	30 à 40 mg/kg/jour
• Cloxacilline (Orbénine)	25 à 100 mg/kg/jour
■ = premier choix de traitement	

 Clarithromycine SPECTRE ANTIMICROBIEN		English Index  
Activité significative sur		Activité limitée sur
- Actinomyces sp. ■ Arcanobacterium sp. ■ Bartonella sp. ■ Bordetella pertussis - Borrelia burgdorferi - Campylobacter jejuni - Chlamydia trachomatis - Chlamydomydia sp. - Clostridium sp. - Corynebacterium diphtheriae - Coxiella burnetii - Haemophilus influenzae - Klebsiella granulomatis ■ Legionella sp. - Leptospira sp. - Moraxella catarrhalis - Staphylococcus epidermidis - Staphylococcus lugdunensis - Ureaplasma urealyticum		- Cutibacterium acnes - Mycoplasma pneumoniae - Peptostreptococcus sp. - Prevotella melaninogenica - Rickettsia sp. - Staphylococcus aureus coagulase negative - Staphylococcus aureus sensible à la méthicilline - Staphylococcus saprophyticus - Streptococcus (groupes c, f et g) - Streptococcus agalactiae - Streptococcus anginosus - Streptococcus pneumoniae - Streptococcus pyogenes (groupe a) - Streptococcus viridans
■ Traitement privilégié		
Note La sensibilité des micro-organismes peut varier de façon locale ou selon le milieu clinique (p.ex., acquis en communauté ou en milieu hospitalier), et ainsi différer des indications générales présentées ici. Le site d'infection et la diffusion tissulaire des antimicrobiens doivent aussi être pris en compte dans la sélection d'un agent pour une situation spécifique.		
Références principales • Canadian Antimicrobial Resistance Alliance (CARA), www.can-r.com • Sanford Guide Web Edition, en ligne		




INFORMATION POUR LES PATIENTS



RxFeuillets
PAR VIGILANCE SANTÉ

Auxiliaire

Mode d'emploi : inhalateur Respimat^{MD}



Assemblage initial

- Appuyez sur le bouton de verrouillage.
- Insérez l'extrémité du canister.
- Remettez en place le capot.

Amorçage de l'inhalateur

Ces étapes doivent être effectuées plus de 3 jours (3 fois par jour) avant l'utilisation.

- Tenez l'inhalateur à l'horizontale.
- Appuyez sur le bouton de verrouillage.

Utilisation de l'inhalateur

- Tenez l'inhalateur à l'horizontale.
- Expirez profondément.
- En même temps, appuyez sur le bouton de verrouillage.
- Continuez à inspirer.
- Retenez votre souffle pendant 10 secondes.
- Expirez doucement.

Nettoyez l'inhalateur au moins une fois par semaine, avec un linge humide ou un mouchoir.

L'inhalateur est muni d'un indicateur de dose. Lorsque le pointeur atteint la partie rouge de l'échelle, l'indicateur de doses se trouve à l'extrémité de l'échelle, l'inhalateur est vide.



RxFeuillets
PAR VIGILANCE SANTÉ

Médicament

Auxiliaire

SPIRIVA RESPIMAT, 2.5MCG, INHALATEUR

☒ Horaire de prise



Description

Ce médicament est habituellement utilisé pour le traitement de l'asthme.

Mode d'emploi

Ce produit doit être inhalé par la bouche. Suivez bien les instructions de votre médecin ou les explications supplémentaires ou une démonstration.

En règle générale, on utilise ce produit une fois par jour.

Vous devez l'utiliser régulièrement et de façon continue pour maintenir ses effets bénéfiques.

Il est important de respecter la posologie inscrite sur l'étiquette. N'en utilisez pas plus, ni plus souvent qu'indiqué.

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. S'il est presque l'heure de votre dose suivante, laissez simplement tomber la dose oubliée. Ne doublez pas la dose suivante pour tenter de vous rattraper.

Effets indésirables

En plus de ses effets recherchés, ce produit peut à l'occasion entraîner certains effets indésirables (effets secondaires), notamment :

- il peut rendre la bouche sèche;
- il peut causer de la constipation - pour la prévenir, buvez beaucoup, prenez plus de fibres alimentaires;
- il peut faire apparaître des boutons et de la rougeur sur la peau;
- il peut provoquer de la toux.

Chaque personne peut réagir différemment à un traitement. Si vous croyez que ce produit est la cause d'un problème qui vous incommoder, qu'il soit mentionné ici ou non, discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. Ils peuvent vous aider à déterminer si votre traitement en est effectivement la cause et, au besoin, vous aider à bien gérer les effets indésirables.



Quiz express sur l'asthme

Index

English

Ce questionnaire vous permet d'évaluer le contrôle de votre asthme. Pour chaque question, encerclez votre choix de réponse (Oui ou Non).

Questions	Réponses	
1. Utilisez-vous votre médicament de secours 4 fois par semaine ou plus ?	Oui	Non
2. Toussez-vous ou souffrez-vous d'une respiration sifflante ou de difficultés à respirer à cause de votre asthme 4 jours par semaine ou plus ?	Oui	Non
3. Vous réveillez-vous pendant la nuit à cause de l'asthme 1 fois par semaine ou plus ?	Oui	Non
4. Avez-vous limité vos activités physiques ou évité d'en faire à cause de votre asthme ?	Oui	Non
5. Votre asthme vous a-t-il obligé à vous absenter de l'école ou du travail ?	Oui	Non

Si vous avez encerclé la réponse **Oui**, même une seule fois, votre asthme n'est pas maîtrisé. Avec un traitement adéquat et des mesures simples prises à la maison, une majorité des asthmatiques peut répondre **Non** à toutes ces questions. Consultez votre professionnel(le) de la santé pour découvrir comment améliorer la maîtrise de votre asthme.

Chaque personne peut réagir différemment à un traitement. Si vous croyez que ce produit est la cause d'un problème qui vous incommoder, qu'il soit mentionné ici ou non, discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. Ils peuvent vous aider à déterminer si votre traitement en est effectivement la cause et, au besoin, vous aider à bien gérer les effets indésirables.

OUTILS CLINIQUES

INFORMATION ET COUVERTURE



Information et couverture

OUTIL PROFESSIONNEL

English

Aricept



- ARICEPT 10MG COMPRIME
- ARICEPT 5MG COMPRIME
- ARICEPT RDT 10MG COMP. RAPIDE
- ARICEPT RDT 5MG COMP. RAPIDE

ARICEPT 10MG COMPRIME

Code générique : 12040013
Classe : PARASYMPATHOMIMETIQUES
Contenu : DONEPEZIL
[Produits similaires](#) [Toutes les teneurs](#)

Couverture Québec

Statut : **Médicament d'exception**
DIN d'exception
02232044

Couverture Premières nations (SSNA)

Statut : **Usage restreint**

Législation

Statut légal : ordonnance requise

Liens utiles

- Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec (INESSS)
- Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)
- Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)
- Tableau de suivi des ruptures de stock

Motifs & critères | Formulaires de réclamation



Médicament d'exception
ARICEPT 10MG COMPRIME

English



Motifs

- score au MMSE de 10 ou plus, à moins d'une justification pertinente;
- diminution du score au MMSE de 3 points ou moins par période de 6 mois comparativement à l'évaluation antérieure ou une baisse supérieure accompagnée d'une justification pertinente;
- stabilisation ou amélioration des symptômes dans un ou plusieurs des cinq domaines suivants :
 - fonctionnement intellectuel, y compris la mémoire;
 - humeur;
 - comportement;
 - autonomie pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie domestique (AVD);
 - interaction sociale, y compris la capacité à tenir une conversation.

La durée maximale de toute autorisation est de 12 mois.

[Service en ligne de la RAMQ](#)

Produits couverts

ACH DONEPEZIL 10MG COMPRIME

JAMP RIVASTIGMINE 3MG CAPSULE

ACH DONEPEZIL 5MG COMPRIME

JAMP RIVASTIGMINE 4.5MG CAPSULE

OUTILS CLINIQUES

DOSAGES PÉDIATRIQUES

**Dosages pédiatriques**
OUTIL PROFESSIONNEL

English |  |  |  | 

Poids de l'enfant : **kg** ▼

Âge de l'enfant : **années** ▼

[Voir le tableau des mesures au 50e percentile](#)

APO CEFPROZIL (125MG/5ML SUSPENSION)

APO CEFPROZIL (250MG/5ML SUSPENSION)

CEFPROZIL (250MG/5ML SUSPENSION)

CEFZIL 100ML (125MG/5ML SUSPENSION)

CEFZIL 100ML (250MG/5ML SUSPENSION)

RAN CEFPROZIL 100ML (125MG/5ML SUSPENSION)

RAN CEFPROZIL 100ML (250MG/5ML SUSPENSION)

TARO CEFPROZIL (125MG/5ML SUSPENSION)

TARO CEFPROZIL (250MG/5ML SUSPENSION)

APO CEFPROZIL (250MG/5ML SUSPENSION) 

Indication : ▼

30 mg/kg/jour

[Personnaliser](#)

2 prises par jour

330 mg/prise

6.6 mL/prise

660 mg/jour

13.2 mL/jour

Quantité totale

10 jours : 132 mL

14 jours : 185 mL

Commentaires :
La durée de traitement peut varier de 10 à 14 jours.

OUTILS CLINIQUES

20 OUTILS DE CALCUL



Outils de calcul
OUTILS D'INDEXATION

English



Aminosides (gentamicine, tobramycine) - dosage initial

Dose de départ de la gentamicine et de la tobramycine selon le modèle traditionnel ou unique quotidien.

Aminosides et vancomycine - ajustement des doses

Calcul du dosage selon creux sérique et pic sérique, imprimable avec section SOAP.

Besoins nutritionnels

Calcul du besoin en calories selon l'activité et les facteurs de stress.

Calcium sérique corrigé

Taux sérique de calcium ajusté en fonction de la concentration d'albumine dans le sang.

Conversion d'unités

Conversion en unités internationales des mesures de cholestérol, triglycérides, créatinine sérique, glycémie, énergie, température et poids.

Conversion de dosages en volume

À partir de la teneur d'un médicament, permet de convertir une dose (mg) en volume (mL).

Débit de perfusion

Calcul du débit de perfusion à partir du volume à administrer et du temps requis pour le faire.

OUTILS CLINIQUES

CALENDRIERS DE PRISE

**Calendriers de prise**
OUTILS D'INDEXATION

English | ↶ | ↷

Calendrier



diminution graduelle de dose (prednisone)

Création d'un calendrier de doses décroissantes d'un médicament sur plusieurs jours.



hebdomadaire

Création d'un calendrier où les doses de médicament varient selon les jours de la semaine.



mensuel manuel

Création d'un calendrier où les doses sont entrées manuellement pour chaque date.



séquentiel

Création d'un calendrier où les doses de médicament varient selon une séquence pré-établie (ex: 1, 2, 1, 2).

Horaire

fiche Dosett

Création d'un horaire quotidien pouvant être inséré dans une Dosett.



produits ophtalmiques

Création d'une grille quotidienne détaillée par heure indiquant l'ordre et l'heure d'administration de différents produits ophtalmiques.



quotidien (par heure)

Création d'une grille quotidienne permettant d'indiquer les doses de médicaments à prendre à chaque heure.

English | Index |  |  |  | 

Calendriers de prise
PAR VIGILANCE SANTÉ

Taille des cases auto |  | 

DIMINUTION GRADUELLE DE DOSE

En-tête d'impression

Pour : Julie Tompson

Établissement : Pharmacie DuCoin

Date : 2021-01-25

Adresse :

Ville :

Données requises

Nom du produit : Prednisone

Dose initiale : 8 comprimé

**Calendriers de prise**
Par Vigilance Santé

Pour : Julie Tompson
Pharmacie DuCoin

Prednisone

Février 2021

dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
	01 8 comprimés	02 8 comprimés	03 8 comprimés	04 8 comprimés	05 8 comprimés	06 8 comprimés
07 7 comprimés	08 7 comprimés	09 6 comprimés	10 6 comprimés	11 5 comprimés	12 5 comprimés	13 4 comprimés
14 4 comprimés	15 3 comprimés	16 3 comprimés	17 2 comprimés	18 2 comprimés	19 1 comprimé	20 1 comprimé
21	22	23	24	25	26	27
28						

OUTILS CLINIQUES MAGISTRALES



Magistrales
INDEX

English | Aide |   

Québec ▾

recherche ...   

Index général

Index des rince-bouches magiques



Acétazolamide 25 mg/mL suspension orale (Ora-Blend ou Ora-Blend SF) (comprimés)
[Acétazolamide](#) • [Ora-Blend ou Ora-Blend SF](#)



Acide acétique 1% solution topique
[Acide acétique glacé](#) • [Eau purifiée](#)



Acide borique 10% pommade topique (gelée de pétrole et chaleur)
[Acide borique](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Acide borique 10% pommade topique (huile minérale et gelée de pétrole)
[Acide borique](#) • [Huile minérale lourde](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Acide borique 600 mg capsules vaginales
[Acide borique](#) • [Capsule de gélatine vide transparente No 0 ou 00](#)



Acide folique 1 mg/mL solution orale (eau stérile pour irrigation) (sol. injectable)
[Acide folique](#) • [Eau stérile](#)



Acide folique 1 mg/mL suspension orale (sirop simple) (comprimés)
[Acide folique](#) • [Essence de framboise](#) • [Sirop simple](#)



Acide salicylique 20% pommade topique (gelée de pétrole et chaleur)
[Acide salicylique](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Acide salicylique 20% pommade topique (huile minérale et gelée de pétrole)
[Acide salicylique](#) • [Huile minérale lourde](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Acide salicylique 3%, soufre 3% pommade topique (huile minérale et gelée de pétrole)
[Acide salicylique](#) • [Soufre précipité](#) • [Huile minérale lourde](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Acide salicylique 30% - soufre 6% pommade topique (huile minérale et gelée de pétrole)
[Acide salicylique](#) • [Huile minérale lourde](#) • [Soufre précipité](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Acide salicylique 30% pommade topique (gelée de pétrole et chaleur)
[Acide salicylique](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Acide salicylique 30% pommade topique (huile minérale et gelée de pétrole)
[Acide salicylique](#) • [Huile minérale lourde](#) • [Gelée de pétrole blanche](#)



Nifédipine 0.2% crème topique
PRÉPARATION MAGISTRALE

English | Aide |    

Québec ▾

 Temps de préparation estimé de 20 à 60 minutes

 Préparation de catégorie 1 ou 2 (selon la quantité préparée)

Produits	Unités	Quantité
Nifédipine poudre	0.2 gramme	
Glycérine	quelques gouttes	
Dermabase émulsion	99.8 grammes	
Total :	100 grammes	

☐ Saisir les lots des ingrédients

Note particulière

La préparation est parfois prescrite à des concentrations légèrement différentes.

D'autres bases de crème (ex. : Glaxal) peuvent être utilisées en remplacement de la Dermabase.

Il est préférable d'utiliser la poudre plutôt que les capsules de nifédipine car il est alors plus facile d'obtenir la quantité exacte d'ingrédient actif (McCluskey et al 2011).

Il peut être nécessaire de dispenser le produit dans un tube muni d'une canule rectale si l'application est interne.

Avant de commencer

- Lire et comprendre le protocole de préparation.
- Vérifier l'habillement et les protections requis par la norme applicable dans votre région pour ce type de préparation.
- Rassembler les ingrédients et le matériel.
- S'assurer de la propreté des équipements et de la surface de travail.
- Vérifier la date de péremption des ingrédients.
- S'assurer que les équipements sont étalonnés correctement.

Précaution

- Nifédipine - Ce produit est photosensible. La diminution de l'intensité de l'éclairage dans la zone de travail est nécessaire.

Matériel requis

OUTILS CLINIQUES MAGISTRALES

- Préparations magistrales maintenant basées sur les normes de l'ANORP (hors Québec seulement)

**Nifédipine 0.2% crème topique**
PRÉPARATION MAGISTRALE

English | Aide |   

Ontario

 Temps de préparation estimé de 20 à 60 minutes

 Préparation de niveau A

Produits	Unités	Quantité
Nifédipine poudre	0.2 gramme	
Glycérine	quelques gouttes	
Dermabase émulsion	99.8 grammes	
Total :	100 grammes	

Préparation de formules magistrales non stériles

La norme publiée par l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP) sépare les préparations en 3 niveaux. Les conditions requises pour la préparation des formules magistrales non stériles en pharmacie diffèrent selon le niveau.

Nous avons associé nos formules maîtresses à l'un de ces niveaux selon notre interprétation de la norme.

**Niveau A**

- Médicaments non-dangereux et matières non-dangereuses.
- Certaines matières dangereuses (SIMDUT) pour lesquelles les protections personnelles de base sont suffisantes.
- Formes pharmaceutiques simples (ex. suspension, solution, crème, etc.) nécessitant l'usage d'instruments de base (ex : cylindre gradué, mortier/pilon, spatule, etc.)

**Niveau B**

- Matières dangereuses (SIMDUT) et certains médicaments dangereux (NIOSH) pour lesquels le port de protections personnelles supplémentaires est recommandé (ex : lunettes de sécurité, gants de protection, masque de protection, etc.).
- Formes pharmaceutiques complexes (ex : capsules, suppositoires, pastilles, etc.) et/ou nécessitant l'usage d'instruments spécialisés (ex : pH mètre, plaque agitatrice, plaque chauffante, etc.)

**Niveau B/C**

- Médicaments dangereux (NIOSH) ou matières dangereuses (SIMDUT) pour lesquels l'utilisation d'une protection respiratoire ou d'une hotte chimique est recommandée, et ce, selon la fréquence et la quantité préparée (petite quantité occasionnelle).

**Niveau C**

- Médicaments dangereux (NIOSH) ou matières dangereuses (SIMDUT) pour lesquels l'utilisation d'une hotte chimique est recommandée.

Pour plus de détails concernant les conditions de préparation requises, consultez le [Document d'orientation à la préparation de produits non stériles en pharmacie](#) et le [Modèle de normes relatives à la préparation de produits non-stériles en pharmacie](#) de l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie.

OUTILS CLINIQUES ÉDITEUR DE PROFIL

- Simulateur de profil
- 3 onglets :
 - Patient
 - Médication
 - Laboratoire

Éditeur de profil
RXVENGINE ET PERSPECTIVES

English | |
Québec

Patient Médication Laboratoire

Âge : an(s)
Sexe : Masculin
Poids : kg
Taille : cm
Surface corporelle : m²
☐ Allaitement
☐ Grossesse

Fonction rénale
☐ Insuffisance rénale
Race noire : Non
Créatinine : mcmol/L
Formule : COCKCROFT
CICr :
☐ Dialyse
Type non spécifié

Caractéristiques
☐ Compétition sportive
☐ Consommation d'alcool
☒ Consommation de pamplemousse
☐ Don de sang
☐ Lentilles cornéennes
☐ Stomie
☐ Tabagisme

Prise de médicaments
☐ Difficulté à avaler des pilules
☐ Prise des médicaments écrasés

Analyse

Nouveau! Analysez votre profil avec le moteur RxvEngine et découvrez notre afficheur de résultat : Perspectives. X

OUTILS CLINIQUES ÉDITEUR DE PROFIL

- Simulateur de profil
- 3 onglets :
 - Patient
 - Médication
 - Laboratoire

English | Québec

Éditeur de profil
RXVENGINE ET PERSPECTIVES

Patient Médication Laboratoire

Médicaments (4)	Quantité	Durée	Dosage / Note		
AG Metformin, 500mg, comprimé				+	🗑️
Apo Lansoprazole, 30mg, capsule ent.				+	🗑️
Apo Ramipril, 5mg, capsule				+	🗑️
Teva Cefadroxil, 500mg, capsule				+	🗑️

Médicaments problématiques (0)	Type de problème
	▼
	▼
	▼

Problèmes de santé (0)

Analyse

Nouveau! Analysez votre profil avec le moteur RxvEngine et découvrez notre afficheur de résultat : Perspectives. X

OUTILS CLINIQUES

ÉDITEUR DE PROFIL • MOTEUR D'ANALYSE

- Type d'information pouvant être envoyée au moteur d'analyse :

Profil courant

- Médicaments + doses
- Diagnostics
- Tests labo anormaux

Patient

- Âge
- Allaitement
- Clairance créatinine
- Dialyse
- Grossesse
- Poids / Taille
- Race
- Sexe
- Surface corporelle

Historique

- Allergies
- Colostomie / Iléostomie
- Intolérances alimentaires
- Intolérances médicaments
- Médicaments à éviter
- Médicaments inefficaces

Style de vie

- Compétition sportive
- Consommation pamplemousse
- Don de sang
- Évite l'alcool
- Prend médicaments écrasés
- Préfère formes liquides
- Tabagisme
- Verres de contact

* Les alertes sont limitées aux informations incluses en intrant

OUTILS CLINIQUES

ÉDITEUR DE PROFIL • MOTEUR D'ANALYSE

POUR LA VERSION WEB

14 types de validation effectués par le moteur d'analyse, selon le type d'information envoyé

- âge
- allaitement
- allergies
- associations atypiques
- dialyse
- doses
- duplications
- grossesse
- insuffisance rénale
- interactions
- analyses de laboratoire
- mises en garde
- stomie
- toxicités cumulatives

3 niveaux d'alerte possibles



Niveau 1

Éviter complètement

Éviter le médicament impliqué. Le risque de problème est sérieux et est plus grand que les bénéfices éventuels.



Niveau 2

Éviter si possible

Si possible, éviter la prise du médicament impliqué. Si impossible, effectuer une intervention pour prévenir les problèmes potentiels.



Niveau 3

Utiliser avec précaution

Évaluer les risques selon la situation clinique et intervenir au besoin.

OUTILS CLINIQUES

ÉDITEUR DE PROFIL • PERSPECTIVES

- Le visualiseur de résultats est un outil clinique à part entière!
- La fenêtre de résultat d'analyse est conviviale et riche en informations!
- Une interface intuitive
 - Navigation facile à travers les résultats de l'analyse
 - Accès rapide à plus d'informations
 - Liens directs vers des outils d'aide à la décision clinique de RxVigilance

The screenshot displays the 'Perspectives ANALYSE DE PROFIL' web application. The interface is organized into several sections:

- Top Bar:** Includes a logo, the title 'Perspectives ANALYSE DE PROFIL', and navigation links for 'English', 'Aide', and icons for printing, home, and a list. A 'COVID-19' button and a language selection dropdown ('Affichage / Sélection') are also present.
- Alerts Section (5 alertes):**
 - Grossesse (Red X icon):** Alert for 'Apo Valsartan HCTZ (Valsartan)' stating: 'Les données cliniques humaines suggèrent un risque important de toxicité foetale.'
 - Grossesse (Orange minus icon):** Alert for 'Apo Valsartan HCTZ (Hydrochlorothiazide)' stating: 'Risque de toxicité foetale, utilisation parfois acceptable.'
 - Interaction (Orange minus icon):** Alert for 'AG Ciprofloxacine (Ciprofloxacine-orale)', 'Pregvit (Calcium-sels)', and 'Pregvit (Fer-sels)'. It notes: 'Formation de complexes non absorbés' and 'Attention! Lors de l'interprétation de cette interaction, tenir compte du fait que plus de deux médicaments sont impliqués et que son impact pourrait être potentialisé.' Below this, a visual shows 'Calcium-sels Fer-sels' and 'Ciprofloxacine-orale' with a plus sign between them.
 - Intervalle QT (Orange minus icon):** Alert for 'AG Ciprofloxacine (Ciprofloxacine-orale)' and 'Apo Valsartan HCTZ (Hydrochlorothiazide)'. It states: 'Risque de prolongation de l'intervalle QT et de torsades de pointes.' It lists 'Médicaments impliqués' (Ciprofloxacine-orale, Hydrochlorothiazide) and 'Facteurs de risque' (Sexe : femme). A link 'médicaments pouvant allonger l'intervalle QT' is provided.
 - Néphrotoxicité (Yellow warning icon):** Alert for 'AG Ciprofloxacine (Ciprofloxacine-orale)', 'Apo Valsartan HCTZ (Hydrochlorothiazide)', and 'Apo Valsartan HCTZ (Valsartan)'. It lists 'Médicaments impliqués' (Ciprofloxacine-orale, Hydrochlorothiazide, Valsartan) and 'Facteurs de risque' (Sexe : femme). A link 'toxicité rénale induite par les médicaments' is provided.
- Profil Section:** Displays patient data: Sexe : femme, Âge : 33 ans, Poids : 58 kg, Taille : 170 cm, IMC : 20, Surface corporelle : 1.671 m².
- RxVigilance+ Section:** Includes a 'Période d'essai gratuit' button and a 'RxIntensi-T' button with a '10' indicator.
- Médicaments Section:** Lists 'AG Ciprofloxacine 500mg comprimé', 'Apo Valsartan HCTZ 80+12.5mg comprimé', 'Diclectin 10+10mg comp. retard', and 'Pregvit comprimé'.
- Indications et conditions Section:** Lists 'Grossesse (trimestre 2)', 'Consomme du pamplemousse', 'Grossesse: nausée/vomissement (Doxylamine + Vitamine-b6)', 'Hypertension artérielle (Valsartan + Hydrochlorothiazide)', and 'Infection (Ciprofloxacine-orale)'. There is also a 'Grossesse (trimestre 2)' sub-section.
- Effets secondaires Section (top 10):** Lists 'Étourdissements', 'Photosensibilité', 'Somnolence', 'Céphalées', 'Nausées', 'Diarrhée', 'Hypokaliémie', 'Fatigue', 'Inconfort abdominal', and 'Vomissements' with corresponding bar charts.
- Voies métaboliques Section:** A section for metabolic pathways.

OUTILS CLINIQUES

ÉDITEUR DE PROFIL • PERSPECTIVES

- Cartes d'alerte

Grossesse

Apo Valsartan HCTZ
(Valsartan)

Les données cliniques humaines suggèrent un risque important de toxicité foetale.

Grossesse

Apo Valsartan HCTZ
(Hydrochlorothiazide)

Risque de toxicité foetale, utilisation parfois acceptable.

Interaction

AG Ciprofloxacine
(Ciprofloxacine-orale)
Pregvit (Calcium-sels)
Pregvit (Fer-sels)

Formation de complexes non absorbés

Attention! Lors de l'interprétation de cette interaction, tenir compte du fait que plus de deux médicaments sont impliqués et que son impact pourrait être potentialisé.

Calcium-sels
Fer-sels + Ciprofloxacine-orale

PLUS DE DÉTAILS

- Médicaments

Médicaments

AG Ciprofloxacine 500mg comprimé
Apo Valsartan HCTZ 80+12.5mg comprimé
Diclectin 10+10mg comp. retard
Pregvit comprimé

Détails des médicaments

Médicaments	Professionnels	Patients
AG Ciprofloxacine 500mg comprimé		
Apo Valsartan HCTZ 80+12.5mg comprimé		
Diclectin 10+10mg comp. retard		
Pregvit comprimé		

Monographie Tableau comparatif Couverture et statut légal Feuillelet médicament

Fermer

OUTILS CLINIQUES

ÉDITEUR DE PROFIL • PERSPECTIVES

Indications

Indications et conditions

Grossesse (trimestre 2)

Consomme du pamplemousse

Grossesse: nausée/vomissement
(Doxylamine + Vitamine-b6)

Hypertension artérielle
(Valsartan + Hydrochlorothiazide)

Infection
(Ciprofloxacine-orale)

Indications et conditions | Liens utiles

Indications

Professionnels

Patients

Grossesse

Grossesse: nausée/vomissement

Hypertension artérielle

médicaments durant la grossesse

acide folique et grossesse

nausées et vomissements liés à la grossesse

guide clinique - OIIQ - nausées et vomissements de la grossesse

nausées et vomissements liés à la grossesse

protocole médical - INESSS - ajustement de la médication antihypertensive

lignes directrices (abrégé) - Hypertension Canada - diagnostic, prévention et traitement de l'hypertension

guides cliniques - RUSHGQ - gestion médicamenteuse en UCDG

guide clinique - Société québécoise d'hypertension artérielle - aide-mémoire

hypertension artérielle

formulaire de suivi de tension artérielle

prise de la tension artérielle

hypertension artérielle - approche alimentaire

régime à faible teneur en sel - approche alimentaire

PLUS DE DÉTAILS

Effets secondaires

Effets secondaires top 10

Étourdissements

Photosensibilité

Somnolence

Céphalées

Nausées

Diarrhée

Hypokaliémie

Fatigue

Inconfort abdominal

Vomissements

Effets secondaires

Effets secondaires | ↑↓

Fréquence | ↑↓

Étourdissements	■	AG Ciprofloxacine Apo Valsartan HCTZ	1-10% 3.9%	▲
Photosensibilité	■	AG Ciprofloxacine Apo Valsartan HCTZ	0-1% 1-10%	▲
Somnolence	■	AG Ciprofloxacine Diclectin	1-10%	▲
Céphalées	■	AG Ciprofloxacine Apo Valsartan HCTZ Diclectin	1.2% 5.1%	▲
Nausées	■	AG Ciprofloxacine	5.2%	▲
Diarrhée	■	AG Ciprofloxacine Apo Valsartan HCTZ Diclectin	2.3% 1.2%	▲
Hypokaliémie	■			▼
Fatigue	■			

DE NOMBREUX AUTRES OUTILS À DÉCOUVRIR ...

**Documentation professionnelle**
ET FORMULAIRES

English |  | 

Catégories de documents

- [Administratif \(43\)](#)
- [Lignes directrices \(24\)](#)
- [Documents cliniques \(181\)](#)
- [Règles et normes \(22\)](#)

Provinces 

- Québec

Légende

-  Documents
-  Formulaires

Administratif
Lignes directrices
Documents cliniques

-  administration d'un médicament parentéral
-  algorithme décisionnel - ABCPQ - opioïdes
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - deprescribing.org
-  algorithme décisionnel - INESSS - allergies
-  algorithme décisionnel - INESSS - Chlamydia (partenaires asymptomatiques)
-  algorithme décisionnel - INESSS - maladies
-  algorithme décisionnel - INESSS - prophylaxie
-  algorithme décisionnel - INESSS - traitement
-  algorithme décisionnel - INESSS - utilisation
-  algorithme décisionnel - MSSS - prise en charge de la douleur lombaire
-  algorithme décisionnel - MSSS - prise en charge de la douleur neuropathique
-  algorithme décisionnel - MSSS - prise en charge de la fibromyalgie
-  algorithme décisionnel - MSSS - prise en charge interdisciplinaire du syndrome de douleur régionale complexe (SDRC)

**Destination Voyage**
PAR VIGILANCE SANTÉ

English | [Index](#) |  | 

ARUBA
PETITES ANTILLES



 **Population** 115,000

 **Capitale** Oranjestad

 **Langues** Néerlandais, papiamentu

 **Monnaie** Florin d'Aruba (AWG)

En bref

Les voyages sont d'excellentes occasions de faire des rencontres et d'en apprendre davantage sur les cultures du monde. Or, qui dit voyage dit possibilité de conditions sanitaires inadéquates et d'exposition à des maladies peu communes au Canada.

Il est important de prendre des mesures préventives pour réduire les risques de contracter une infection; le présent document vous indique comment procéder en fonction de votre destination pour voyager en santé et en sécurité.

Immunisation générale

Les immunisations (vaccins) et les dépistages recommandés ou exigés par les autorités sanitaires de la destination à laquelle vous vous rendez sont indiqués dans ce document.

Les recommandations générales s'adressent à l'ensemble des voyageurs; un centre de santé-voyage sera disponible pour vous offrir un programme de protection adapté à vos besoins et à votre état de santé. Si plusieurs vaccins sont recommandés, vous devrez peut-être attendre plusieurs semaines pour compléter le programme de vaccination.

Hépatite B


La vaccination est recommandée pour la plupart des voyageurs.

Rage

Le vaccin est recommandé uniquement pour des groupes particuliers de voyageurs. On pense entre autres aux individus qui travailleront sur place en tant que vétérinaires, animaliers ou spéléologues, ainsi qu'aux voyageurs aventureux.

Fièvre jaune

Pictogrammes posologiques



Indication

Cliquez sur la silhouette pour faire apparaître la cible. Positionnez avec la souris.

Dose

Appliquez la crème et faites pénétrer

Fréquence

le matin


Précisions

au coucher

Imprimer

Retour à la sélection

Le projet de pictogrammes posologiques est une réalisation de la section Military and Emergency Pharmacy Section (MEPS) de la FIP. Cette page a été développée en partenariat avec Vigilance Santé.



RXphotos

BANQUE DE PHOTOS
DE MÉDICAMENTS

RXPHOTOS EN BREF

- ▶ **UNE BANQUE** de plus de **50 000 photos de médicaments et de leurs emballages**
 - Couvre la plupart des médicaments disponibles au Canada
- ▶ **TROIS SERVICES** associés à cette banque

Version
WEB

RxPhotosID


Deux autres services disponibles
POUR INTÉGRATION

Base complète
de données à intégrer
à des logiciels tiers

Affichage de photos
pour la vérification
de piluliers

RXPHOTOS EN BREF

- ▶ Des **IMAGES** de qualité supérieure
- ▶ Des **MISES À JOUR** mensuelles
- ▶ Description texte de l'apparence
- ▶ Filtres de recherche disponibles
- ▶ Apparences antérieures conservées



RXphotos

EN DÉTAILS

RXPHOTOS

IDENTIFIEZ RAPIDEMENT UN PRODUIT

- Recherche par produit
 - Nom commercial
 - DIN
 - Ingrédient actif

 **RXphotos ID**
Par Vigilance Santé

English |  | 

Par produit

Par apparence

Nom commercial ou DIN

Rechercher

Ingrédient actif

Rechercher

☐ Inclure les produits discontinués

Recherche de produits pour : Biaxin
4 résultat(s) trouvé(s) selon les critères spécifiés

0

 Filtrer les résultats de recherche ▼


BIAXIN
125MG/5ML
BGP


BIAXIN
250MG/5ML
BGP


BIAXIN BID
250MG
BGP


BIAXIN BID
500MG
BGP

< page 1/1 >

RXPHOTOS

IDENTIFIEZ RAPIDEMENT UN PRODUIT

- Recherche inversée
 - Par apparence

**RXphotos ID**
Par Vigilance Santé

English |  | 

Par produit

Par apparence

Type

 comprimé

 capsule

Côté 1

Côté 2

Inscription

☐ Logo ☐ Aucune

☐ Logo ☐ Aucune

Couleur

Bleu

Bleu

Forme

Caplet

Surface

Rainure

Rechercher

Réinitialiser

0

Filter les résultats de recherche



AG METOPROLOL L

100MG
ANG



APO EMTRICITABI
TENOFVIR

300+200MG
APX



APO METOPROLOL L

100MG
APX



APO MYCOPHENOLATE

500MG
APX



APO NADOLOL

160MG
APX



APO SOTALOL

160MG
APX



APO SOTALOL

80MG
APX



APO VALACYCLOVIR

500MG
APX



AURO VALACYCLOVIR

500MG
AUA



BIO CALCIUM D

500MG+400UI
BIO



BIO PAROXETINE

30MG
BIO



BIO VALACYCLOVIR

500MG
BIO

< page 1/8 >

4



RXphotos

RXvigilance

INTRODUCTION À **VIGILANCESanté**



AU PROGRAMME

- **VIGILANCE SANTÉ** | entreprise • clients • expertise
- NOS **PRODUITS** ET **EXPERTISE**
- NOTRE PRODUIT PHARE : **RxVigilance**
- UN AUTRE PRODUIT APPRÉCIÉ : **RxPhotos**
- AVANTAGES POUR LE MILIEU ACADÉMIQUE
- CONCLUSION ET QUESTIONS





VIGILANCEsanté

NOUS SOMMES


- ▶ Une entreprise québécoise
- ▶ Fondée par un pharmacien
- ▶ En affaires depuis 1991



NOTRE MISSION

Allier savoir, intelligence
et **technologie** pour outiller
les professionnel·le·s de la
santé de première ligne.





NOUS DÉVELOPPONS




des logiciels et
des bases de données
spécialisés dans les
traitements médicamenteux.

Nous répondons aux besoins évolutifs
des équipes de soins de santé
de première ligne et aux exigences
de leur pratique.

NOTRE ÉQUIPE

de 70 personnes
est reconnue pour
son **expertise** et
sa **force créative**.

-
- 20 pharmaciens•ne•s
 - 25 développeurs et développeuses
 - Équipe de services aux clients
 - Recherche et développement



NOS PRODUITS

sont développés
et entretenus par

VIGILANCEsanté

et se distinguent
de la concurrence



Le contenu de nos logiciels est élaboré par notre équipe unique de 20 pharmaciens pour être fiable et objectif.

Le développement technique de haute qualité est assuré par nos équipes internes de développement, d'assurance qualité et de TI.

NOS SOLUTIONS

sont développées
au **Canada**, pour le
marché canadien.

- ▶ Contenu
100% canadien
- ▶ Entièrement bilingues
(français et anglais)



NOS UTILISATEURS

sont déjà plus de 50 000 à travers le Canada à considérer nos produits comme des incontournables.



Pharmacies
communautaires



Hôpitaux et
centre de recherche



Cabinets médicaux
et dentaires



Organisme et
établissements



Développeurs de
logiciels de santé



NOS SERVICES

sont axés sur les besoins de
nos clients et de nos partenaires

Services entièrement bilingues
(français et anglais) :

- ▶ Aide à l'intégration
- ▶ Formation des clients
- ▶ Assistance technique en tout temps
- ▶ Soutien clinique et professionnel

Merci!



VIGILANCEsanté

Contactez-nous
pour plus d'information
info@vigilance.ca



vigilance.ca