

LAVAGE DES MAINS EST LA MESURE LA PLUS IMPORTANTE

INFECTION	MODE DE TRANSMISSION « PRÉCAUTION »	TYPE DE PRESSION	PARTICULARITÉ
SARM	Contact	N/A	Jaquette – gants. Masque si symptômes respiratoires, intubé, trachéotomisé, bronchoscopie et lors des changements de pansement.
ERV	Contact	N/A	Jaquette - gants
C. Diff.	Contact +	N/A	- Isoler dès suspicion (diarrhées x 3 / 24 hres, prise antibiotique récente et/ou odeur caractéristique) - Jaquette disponible – gants - Isolement ad retour selles normales X 72 hres - Se laver les mains avec de l'eau et du savon
INFLUENZA SAG (syndrome d'allure grippal)	Gouttelettes et contact	N/A	- Jaquette – masque - gants - Isolement 5-7 jours ou après disparition des symptômes - patient immunosupprimé consulter l'équipe de prévention
GASTROENTERITE	Contact +	N/A	- Jaquette – gants - isolement ad 48 heures sans symptômes (diarrhées – vomissements)
TUBERCULOSE	Aérienne	Négative	- masque N 95 - porte et fenêtre fermées en tout temps
GRIPPE AVIAIRE SRAS	Aérienne et Contact	Négative	- masque N 95 – protection oculaire – gants - jaquette - porte et fenêtre fermées en tout temps
VARICELLE ZONA (DISSÉMINÉ) Zona atteignant une seule région : couvrir plaie ad formation de croûte (seulement)	Aérienne et contact	Négative	- Isoler ad toutes lésions soient sèches et croûtées - masque N 95 – jaquette – gants - porte et fenêtre fermées et tout temps - Si patient immunosupprimé ou non immunisé, consulter l'équipe de prévention
GALE POUX	Contact	N/A	- Isolement ad 24 heures post traitement - vêtements et literie doivent être lavés à l'eau chaude ou mis dans un sac X une semaine.
MÉNINGITE BACTÉRIENNE	Adulte : Gouttelettes ad résultat de culture Enfant : contact et gouttelettes	N/A	Adultes : - Virale : mesures de base - Bactérienne : gouttelettes X 24 heures antibiotique efficace pour meningocoque Enfants : - Virale : contact - Bactérienne : gouttelettes X 24 heures antibiotique efficace pour meningocoque
NEUTROPÉNIE	Technique inversée	Positive	- Isolement dans le but de protéger LE patient - Jaquette – gants – masque (si symptôme respiratoire)