Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Québec

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom, Prénom de la mère : _____

PERFUSION D'ALBUMINE 25%
SUITE A UNE EVACUATION D'ASCITE

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

INTENTION THÉRAPEUTIQUE

Prévention des complications volémiques des drainages d'ascite chez les usagers cirrhotiques

INDICATIONS

- Drainage d'ascite pour évacuation de plus de 5 L. L'albumine est indiquée en cas de retrait d'ascite secondaire à une défaillance hépatique
- Albumine 25% doit être utilisé avec précaution chez : insuffisance cardiaque compensée ou non, hypertension, varices œsophagiennes, œdème pulmonaire, diathèse hémorragique, anémie grave ou insuffisance rénale.
- L'albumine 25% est contre-indiquée chez la clientèle avec anémie sévère ou défaillance cardiaque

CRITÈRES D'EXCLUSION (Albumine non nécessaire)

- Ascite causée par une néoplasie. L'albumine n'est pas indiquée en cas d'ascite carcinomateuse, même si plus de 5 L d'ascite sont retirés
- Un INR élevé ou une thrombopénie **ne sont pas** des critères d'exclusion pour faire une ponction d'ascite

ORDONNANCES À EFFECTUER DÈS LA PRESCRIPTION DU DRAINAGE D'ASCITE

- Faire signer le consentement aux transfusions sanguines (médecin)
- Installer un cathéter salin perméable
- Aviser la banque de sang que l'albumine sera nécessaire sous peu
- Dès le retour de l'usager, l'infirmière doit procéder à la perfusion dans l'heure suivant la ponction selon le barème ci-dessous
- Commander les unités supplémentaires et débuter dès que l'albumine25% est reçue
- Chaque flacon doit être transfusé selon les règles établies pour le centre désigné, il faut se référer au document en vigueur dans votre composante
- Si aucune perfusion n'est nécessaire, retourner le flacon d'albumine à la banque de sang
- Prendre les signes vitaux (TA, FC, RR, SpO_2, T^o) avant de débuter la perfusion. Reprendre les signes vitaux 15 minutes après le début, aux heures, à la fin, 1 heure et 4 heures après la fin de la perfusion

ALBUMINE À TRANSFUSER (1 flacon de 25% de 100 mL = 25 g d'albumine)

Pour les drainages de 5 litres et plus, une transfusion de 8 g/L est suggérée

_____ Albumine 25% (100 mL) à transfuser selon le nombre de litres drainés selon le barème suivant
Initiales

5,00 à 5,99 L : 1 flacon d'albumine 25% de 100 mL (pour usager avec TAS inférieure à 100 mmHg de base)
6,00 à 6,99 L : 2 flacons d'albumine 25% de 100 mL
7,00 à 9,99 L : 3 flacons d'albumine 25% de 100 mL
10,00 à 12,99 L : 4 flacons d'albumine 25% de 100 mL
13,00 à 15,99 L : 5 flacons d'albumine 25% de 100 mL

SECTION À COMPLÉTER PAR L'INFIRMIÈRE SUITE AU DRAINAGE

Quantité drainée : _____ litre(s) à _____ le _____ Signature : _____
HH : MM AAAA-MM-JJ

_____	_____	_____
Date et heure (aaaa/mm/jj)	Signature du prescripteur	# permis

☐ Envoyé par _____ (init.) Heure d'envoi : _____ Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)