

Précautions à la maison après un traitement avec un agent antinéoplasique

	Consignes générales à appliquer	Agent antinéoplasique Précautions pour 96 heures (4 jours) après la dernière dose
Lavage des mains	Se laver les mains vigoureusement avec de l'eau et du savon après être allé aux toilettes et après avoir touché à ses liquides biologiques (sang, urine, etc.).	
Liquides biologiques	Si vous avez reçu un agent antinéoplasique par voie vésicale (dans la vessie) : • Uriner en position assise pour éviter les éclaboussures. • Si possible, les membres de la famille doivent utiliser une toilette différente à celle utilisée par l'utilisateur. • Se laver les parties génitales et les mains à l'eau et au savon après avoir uriné. POUR LES PORTEURS DE CATHÉTERS À DEMEURE : • Nettoyer l'embout de la tubulure du sac de drainage avec de l'eau et du savon (jeter ou laver la débarbouillette séparément après chaque usage).	• Fermer le couvercle de la toilette après l'utilisation et actionner la chasse d'eau deux fois après avoir uriné. • Nettoyer la toilette et le plancher autour de la toilette chaque jour (lingette réservée à cet usage). • Nettoyer avec du savon et de l'eau s'il y a des vomissements • Pour les usagers INCONTINENTS, laver les parties génitales avec de l'eau et du savon et utiliser une crème protectrice sur les parties génitales et le fessier si nécessaire. • Jeter les produits d'incontinence souillés (culottes, protège-dessous) dans deux sacs à déchets réguliers fermés et jeter. POUR LES PORTEURS DE CATHÉTERS À DEMEURE : • Éviter le changement de sac collecteur pour 96 heures après l'administration d'un agent antinéoplasique.
Lessive	• La literie et les vêtements qui ne sont pas visiblement souillés peuvent être lavés avec le lavage régulier.	• Laver la literie et les vêtements souillés par les liquides biologiques de la personne recevant des traitements d'agents antinéoplasiques séparément de ceux des autres membres de la famille. • Un double lavage à l'eau chaude peut être envisagé si la literie est très souillée.

Précautions à la maison après un traitement avec un agent antinéoplasique

	Consignes générales à appliquer	Agent antinéoplasique Précautions pour 96 heures (4 jours) après la dernière dose
Relations sexuelles		L'utilisateur ou son partenaire doit porter un condom lors de contacts sexuels durant les 96 heures qui suivent le traitement. Le sperme et les sécrétions vaginales peuvent contenir des résidus de médicaments dangereux.
Contraception	- Obtenir un avis médical si on désire avoir des enfants après le traitement. - Vérifier si cette discussion a eu lieu avec le médecin avant le traitement.	Prendre les moyens pour éviter une grossesse pour les femmes recevant des traitements d'agents antinéoplasiques ainsi que pour les conjointes des hommes traités.
Contacts avec les proches	- S'embrasser, dormir et faire des activités avec les proches est possible et non risqué - Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent éviter de manipuler ou d'être en contact avec les liquides biologiques de l'utilisateur. - Les proches doivent porter une paire de gants conformes aux normes pour manipuler les excréta, les vêtements et la literie souillés.	
Hydratation	- Boire 8 à 10 verres de liquide de 8 onces ou 250 mL (eau, jus de fruits ou de légumes, lait, bouillons, soupes ou tisanes) par jour pour les 48 heures suivant le traitement, sauf si contre-indication médicale (ex. : insuffisance cardiaque, problème rénaux, etc.). - Éviter l'alcool et les boissons contenant de la caféine	
Prise de médication	Ne pas prendre de nouveaux médicaments sans aviser le médecin ou le pharmacien, car certains médicaments peuvent parfois diminuer l'effet du traitement	