

Installation : _____

Dossier : _____
Nom, Prénom : _____
Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ
NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM
Nom de la mère : _____

FEUILLET D'INFORMATION

PRÉPARATION POUR DÉCOLONISATION AVANT UNE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Prévenez les infections

Nous vous avons informé que votre culture nasale en préopératoire était positive pour la présence d'une bactérie connue sous le nom de *Staphylococcus aureus*. Les *Staphylococcus aureus* sont des bactéries retrouvées chez 20 % de la population. Généralement, elles sont présentes sur la peau, dans les endroits chauds et humides du corps (narines, aisselles, aines). Cette bactérie peut provoquer des infections de peau, de plaies et respiratoires.

Lors d'une chirurgie, les usagers qui ont cette bactérie sont plus à risque de contracter une infection de plaie ou de prothèse (hanche, genou ou toute autre prothèse). Nous pouvons vous aider à diminuer la présence de cette bactérie sur vous afin de diminuer le risque d'infection.

Pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre à la pharmacie pour vous procurer les traitements prescrits.

Nous vous recommandons de respecter les étapes d'utilisation mentionnées ci-dessous.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LA DÉCOLONISATION :

- Porter des vêtements nouvellement lavés chaque jour, pendant la durée du traitement;
- Porter des vêtements de nuit nouvellement lavés chaque jour, pendant la durée du traitement;
- Changer les draps du lit au début du traitement et la veille de l'opération.

1. L'onguent mupirocine 2 fois par jour (matin et soir), pendant 5 jours, dans chaque narine :

- Laver vos mains avec de l'eau et du savon;
- Appliquer l'onguent mupirocine sur un coton-tige (grosseur d'un pois);
- Insérer le coton-tige dans une narine, à une profondeur de 1 à 2 cm (½ pouce);
- Effectuer 5 rotations complètes dans la narine et jeter le coton-tige;
- Répéter les mêmes étapes pour l'autre narine avec un coton-tige propre;
- Masser la narine quelques secondes pour étendre l'onguent à l'intérieur du nez;
- Laver vos mains avec de l'eau et du savon après l'application;
- Répéter l'opération tous les jours, 2 fois par jour, pendant 5 jours.

(IMPORTANT! La dernière application doit être faite la veille ou le jour de la chirurgie.)

2. Le savon antiseptique de gluconate de chlorhexidine 4 % :

- Laver vos cheveux tous les jours (shampooing ordinaire), avant de procéder à l'utilisation du savon antiseptique chlorhexidine 4 %;
- Mouiller tout le reste du corps avec de l'eau;
- Utiliser une quantité suffisante de savon antiseptique lors de la douche ou du bain (30 mL à 60 mL);
- Appliquer le savon antiseptique à partir du visage en descendant jusqu'aux pieds (ne pas oublier les mains, les ongles, les aisselles, les aines et le pourtour de l'anus);
- **Ne pas utiliser le savon antiseptique dans les yeux ou à l'intérieur des oreilles;**
- Ne pas oublier de bien appliquer le savon antiseptique sur la région qui sera opérée;
- Frictionner légèrement à l'aide de la main ou d'une débarbouillette humide;
- Laisser agir le savon antiseptique pendant 1 minute;
- Rincer à grande eau;
- Utiliser une serviette propre pour vous assécher en terminant par les organes génitaux et l'anus;
- Répéter **les étapes précédentes tous les jours pendant 5 jours;**
- (IMPORTANT! La dernière application du savon chlorhexidine doit être faite la veille ou le jour de la chirurgie.)
- Il faut éviter d'utiliser vos crèmes habituelles pour la durée du traitement, car certaines crèmes pourraient empêcher la **chlorhexidine** d'agir correctement et peuvent augmenter le risque de contamination.

EFFETS SECONDAIRES

Les traitements écrits ci-dessus sont généralement bien tolérés.

- Si vous présentez des irritations cutanées sévères ou éruptions cutanées nouvelles : cessez l'utilisation du produit.
- Vous devez éviter le contact du savon antiseptique dans les yeux et à l'intérieur des oreilles. Si toutefois cela se produit : rincez abondamment la région touchée avec de l'eau.

Consultez un médecin si les problèmes de peau persistent ou si vous avez une inquiétude.

ALLERGIES

Si vous avez des allergies à la mupirocine et au savon de gluconate de chlorhexidine 4 %, vous **ne pouvez pas suivre ce traitement.**

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions au sujet des traitements, vous pouvez contacter l'infirmière en préadmission

☐ Hôpital Anna-Laberge au 450-699-2425 poste 2571

☐ Hôpital du Suroît au 450-371-9920 poste 2950

☐ Hôpital du Suroît
150, rue Saint-Thomas
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 6C1
Téléphone : 450 371-9920
Télécopieur : 450 377-0185
www.santemo.quebec

☐ Hôpital Anna-Laberge
200, Boul. Brisebois
Châteauguay (Québec) J6K4W8
Téléphone : 450 699-2425
Télécopieur : 450 699-2525
www.santemo.quebec