

HÔPITAL ANNA-LABERGE

QUESTIONNAIRE SUPPLÉANCE RÉNALE

Dossier : _____

Nom, prénom _____

Date de naissance : ____ / ____ / ____ ☐ F ☐ M
année mois jour

Nom de la mère : _____

Nom du père : _____

SARM-ERV : Avez-vous été hospitalisé au cours de la dernière année pendant plus de 24 heures? ☐ **NON**

☐ **OUI** (à l'hôpital ou dans un centre de réadaptation au Québec)

Lequel : _____ Date : _____

Dépistage	
Initiales	

 IPSE
Dans une autre PROVINCE/PAYS, nommez : _____ Date : _____

EPC-A : Avez-vous reçu des soins à l'extérieur du Canada ou été hospitalisé dans un hôpital montréalais ou à l'hôpital du Suroît (Valleyfield) plus de 24 heures au cours de la dernière année? ☐ **NON**

☐ **OUI**
Lequel : _____ Date : _____

Dépistage	
Initiales	

 IP EPC-A

Si l'utilisateur est identifié comme « CONTACT ERV » :

Dépistage	
Initiales	

 IPE

Si l'utilisateur est identifié comme « CONTACT EPC-A » :

Dépistage	
Initiales	

 IP EPC-A

Êtes-vous porteur d'une bactérie résistante aux antibiotiques? ☐ **NON**

☐ **OUI**
Laquelle? ☐ SARM ☐ ERV ☐ EPC-A

Dépistage	
Initiales	

 IS ou IE ou ISE ou IEPC-A

Autres particularités :

N.B. Les dépistages de SARM et ERV doivent être effectués chaque mois.

Date des prélèvements : _____

Dépistage	
Initiales	

 S E

Date : _____ Signature : _____
(signature de la personne qui complète le questionnaire)

**IS (Isolement SARM)
IE (Isolement ERV)
ISE (Isolement SARM/ERV)
IEPC-A
(Isolement entérobactéries productrices de carbapénémases et
Acinetobacter multi résistant**

SARM – ERV – EPC-A

- Placer l'usager en isolement de contact.

IPSE (Isolement préventif SARM – ERV)

Dépister l'usager et le placer en isolement préventif SARM – ERV.

IPE (Isolement préventif ERV)

Dépister l'usager et le placer en isolement préventif ERV.

SE (SARM – ERV)

Ne pas placer l'usager en isolement.
Dépister l'usager pour le SARM et l'ERV.

IPEPC-A

Dépister l'usager et le placer en isolement préventif EPC-A.

SITES DE DÉPISTAGE SARM – ERV – EPC-A

Pour la recherche de SARM

- Culture du nez
(1 écouvillon pour les 2 narines)
- Culture de plaie si écoulement
(1 écouvillon par site)
- Site infectés/colonisés
(se référence à l'ordonnance collective)

Pour la recherche ERV

- 1 écouvillonnage rectal
- 1 écouvillonnage du site de colostomie

Pour la recherche d'EPC-A

- 1 écouvillonnage rectal
- 1 écouvillonnage à l'intérieur des joues (A)