

**DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS ET DE LA QUALITÉ
PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION DES INFECTIONS
RÉADAPTATION PHYSIQUE**

GÉNÉRALITÉS

- Pratique de base entre chaque patient
- Vérifier dans Hélios et/ou dossier antérieur si le patient est porteur de bactéries multi-résistantes (SARM/ERV/BGNMR). Demander à la commis de bien identifier sur les listes de rendez-vous si présence d'un avis et transmettre clairement cet avis au thérapeute.
- À l'arrivée, inviter le patient (et accompagnateur) à se laver les mains.

SARM ou BGNMR (ESBL)

1. Avant le traitement/consultation :

- Couvrir la civière/chaise avec un drap propre
- Sortir le matériel de la salle et/ou dessous le lit. Si le matériel ne peut être déplacé, le couvrir avec un drap propre.

Durant le traitement :

- Isoler le patient dans un local seul ou dans un environnement précis
 - Utiliser l'affiche identifiant la précaution additionnelle à l'entrée du local
 - La thérapeute et le patient doivent se vêtir d'une blouse jaune attachée à l'arrière et mettre des gants non stériles (stériles selon le cas).
2. Si durant le traitement le thérapeute doit sortir de la pièce, retirer les gants et la blouse jaune puis procéder à l'hygiène des mains (les sacs de literie souillée et à déchets se trouvent à l'intérieur de la pièce).
 3. Toutes les surfaces contaminées ainsi que le matériel utilisé doivent être désinfectés avec du peroxyde d'hydrogène 0,5% à la fin du traitement. **Laisser sécher à l'air libre** avant d'utiliser la salle à nouveau.
 4. Garder l'affiche en place jusqu'à la désinfection finale après le départ du patient.
 5. À la fin du traitement, s'assurer que les mains du patient et du thérapeute sont bien désinfectées après le retrait des gants et de la blouse jaune.
 6. Si possible, céder les patients porteurs d'une bactérie multi-résistante en fin de programme (horaire).

N.B. Ne pas laisser les patients circuler librement dans les locaux.

ERV

- Même produit désinfectant que le SARM
- Toujours désinfecter le matériel, les surfaces et les mains X 2 (en respectant le temps de séchage X2).

Clostridium difficile

- Demander le service d'hygiène et salubrité pour la désinfection en 3 étapes : peroxyde d'hydrogène – rinçage – H₂O javel

ENTRETIEN RÉGULIER QUOTIDIEN

Entretien ménager à tous les soirs (plancher et surfaces High Touch).