

Destinataires : Marc-André Masse, chef de l'urgence – Hôpital Anna-Laberge

Expéditeur : Annie Marceau, responsable PCI – Secteur Jardins Roussillon

Date : Jeudi 22 novembre 2018

Secteur ciblé : ☐ CISSS de la Montérégie-Ouest ☒ Jardins-Roussillon ☐ Suroît
☐ Haut Saint-Laurent ☐ Vaudreuil-Soulanges

Objet : Recommandations PCI pour les précautions additionnelles gouttelettes et contact urgence - HAL

Mise en contexte

La gestion des précautions additionnelles dans la salle d'urgence est tributaire à l'augmentation du nombre d'usagers atteints d'une infection respiratoire et de la gastro-entérite. L'application des précautions additionnelles de type gouttelettes-contact demeure un exercice laborieux dans l'environnement de l'urgence. À cet effet, pour plusieurs usagers ces types d'infections peuvent avoir de graves conséquences sur leur état de santé, notamment, augmenter le nombre de jours d'hospitalisation.

Compte tenu que

La saison de la grippe et de la gastro-entérite (novembre à juin) augmente de façon significative le nombre de cas en cette période et que les équipes nécessitent différents rappels et recommandations afin de faire une gestion des usagers nécessitant des précautions additionnelles dans un contexte de soins d'urgence et temporaire.

Recommandations

1-RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

- S'assurer du respect rigoureux des pratiques de base, en particulier l'hygiène des mains, notamment le moment avant, et la désinfection des équipements partagés, et ce, tout au long de l'année;
- Instaurer rapidement les précautions additionnelles de type gouttelettes et contact lors de symptômes associés à la grippe (syndrome d'allure grippal), une infection respiratoire ou une gastro-entérite virale.

2-RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

- S'assurer de cohorter dans les espaces ciblés, 2 usagers avec des résultats similaires avec une chaise d'aisance dédiée :
 - ✓ Jumeler 2 usagers avec résultats d'influenza A, 2 usagers avec influenza B ou 2 usagers avec le VRS¹ ensemble dans un même cube (1 à 6, 19 à 22);
 - ✓ Installer les usagers avec grippe et gastro aux civières (14 à 18) en s'assurant de leur dédier une chaise d'aisance;
 - ✓ Proscrire l'utilisation des corridors de débordement pour les usagers en précautions additionnelles.
- Porter le masque de façon sécuritaire, proscrire le masque sous le nez de même que sous le menton, éviter de toucher l'extérieur, dans ce cas-là, le retirer, procéder à l'hygiène des mains et en revêtir un autre;
- Prolonger les précautions additionnelles chez l'enfant avec un VRS négatif (ASPC, 2014);
- Instaurer les précautions additionnelles gouttelettes et contact dès le dépistage ou lorsque que l'on constate/évalue les symptômes; ex bronchiolite chez l'enfant;
- Les visiteurs (y compris les parents) doivent porter l'équipement de protection individuelle et avoir une pratique rigoureuse de l'hygiène des mains;
- Faites-vous vacciner contre la grippe, il est encore temps et les premiers bilans démontrent que la souche qui circule est incluse dans le vaccin 2018-2019.

Références

Agence de la santé publique du Canada (2014). Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins.

Institut national de santé publique du Québec (2013). Mesures de prévention et contrôle des infections à l'urgence.

¹ VRS : Virus respiratoire syncytial.