




RETOUR À DOMICILE AVEC UN DRAIN « JACKSON-PRATT »

Ce que vous devez savoir

Ce feuillet a pour but
de vous informer
sur l'utilisation du drain
« Jackson-Pratt »
installé temporairement
à la suite d'une chirurgie.

Qu'est-ce qu'un drain « Jackson-Pratt » ?


Un drain est un tube qui a été installé temporairement à la suite d'une chirurgie. Il empêche l'accumulation de sang et de liquide à l'intérieur de votre corps. Il est installé près de la région de votre chirurgie. Il ne restreint pas votre retour à domicile, car sa manipulation est simple et sans risque.


En général, le drain peut rester en place entre 5 à 10 jours, selon l'ordonnance de votre chirurgien. Ce dernier ou une infirmière sera responsable de le retirer au moment déterminé.

**En aucun cas, vous ne devez le retirer
par vous-même.**

Le drain « Jackson-Pratt » est composé de deux parties :

- Un **petit tuyau** qui relie votre corps au réservoir.
- Un **réservoir** qui permet de recueillir les liquides qui s'y accumulent.





RETOUR À DOMICILE AVEC UN DRAIN « JACKSON-PRATT »

Ce que vous devez savoir

En tout temps, assurez-vous de laver vos mains avant et après avoir manipulé votre drain.

Surveillance de votre drain

- Assurez-vous que le tuyau du drain n'est pas sous tension, clampé, coudé ou détaché de son réservoir.
- Assurez-vous que le réservoir ne soit pas trop plein et faites la vidange du réservoir dès qu'il atteint le **2/3**. Avisez s'il y a une augmentation soudaine du volume d'écoulement dans votre réservoir.
- Surveillez la couleur et la consistance du liquide qui s'écoule. La couleur du liquide peut être **variable**; elle peut être rougeâtre, jaune rosé ou jaune. Avisez si vous remarquez un changement important (par exemple, s'il y a un écoulement soudain de couleur verte ou de sang clair). Assurez-vous que le réservoir est situé en dessous de l'endroit où le tuyau est inséré dans votre corps pour permettre au liquide de bien s'écouler.
- Assurez-vous que le réservoir est bien fixé à vos vêtements en tout temps avec une épingle.
- Assurez-vous que le pansement reste propre et sec en tout temps. Ne prenez pas de bain ou de douche tant que le drain est en place.
- Assurez-vous que le réservoir du drain est comprimé en tout temps. Au besoin, refaites le vide d'air du réservoir.


Si vous avez plus d'un drain, vous devez effectuer la vidange de chacun des réservoirs séparément.

Vidange du drain

Vous devez faire la vidange du drain au moins deux fois par jour (matin et soir). Il est possible que vous deviez faire plus souvent la vidange du drain dans les premiers jours. En aucun temps, vous ne devez rincer l'intérieur du réservoir.


La marche à suivre :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.
2. Ouvrez le contenant gradué que vous avez reçu lors de votre chirurgie.
3. Ouvrez le bouchon en tenant le réservoir en position neutre, soit le bouchon vers le haut.
4. Retournez le réservoir pour permettre la vidange du liquide dans le contenant gradué en évitant que le réservoir touche les rebords du pot.




RETOUR À DOMICILE AVEC UN DRAIN « JACKSON-PRATT »

Ce que vous devez savoir




5. Au besoin, compressez doucement le réservoir pour faciliter la vidange.
6. Une fois terminée, faites le vide d'air du réservoir :
 - a. Retournez le réservoir en position neutre, le bouchon vers le haut;
 - b. Compressez doucement le réservoir;
 - c. Fermez le bouchon.
7. Fixez le drain à vos vêtements.
8. Mesurez et inscrivez la quantité et la couleur du liquide dans le tableau.
9. Videz le contenu du pot dans la toilette. Rincez le pot gradué et remettez le couvercle.
10. Lavez-vous les mains.



Il est important de noter :

- Ne prenez pas de bain ou de douche tant que le drain est en place.
- Consultez **Info-Santé (811)** ou l'infirmière de votre CLSC si vous présentez ces signes et symptômes :
 - Frissons ou fièvre (plus grand ou égale à 38,5 °C ou 100,4 °F);
 - Liquide avec odeur nauséabonde;
 - Changement de l'aspect du liquide (couleur ou consistance);
 - Augmentation rapide de la quantité de liquide;
 - Arrêt soudain de l'écoulement;
 - Douleur qui augmente au site du drain;
 - Pansement décollé ou mouillé;
 - Le réservoir se gonfle immédiatement après avoir remis le bouchon.



RETOUR À DOMICILE AVEC UN DRAIN « JACKSON-PRATT »

Ce que vous devez savoir

JOUR 0 (chirurgie)

Heure	Quantité	Couleur
Total :		

JOUR 1

Heure	Quantité	Couleur
Total :		

JOUR 2

Heure	Quantité	Couleur
Total :		

JOUR 3

Heure	Quantité	Couleur
Total :		

JOUR 4

Heure	Quantité	Couleur
Total :		

JOUR 5

Heure	Quantité	Couleur
Total :		

Notre mission

Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec.

Notre vision

Des soins de santé et des services accessibles et efficaces qui s'adaptent aux besoins des Québécois.

Nos ambitions

Le CISSS de la Montérégie-Ouest réalise ses ambitions en osant innover dans ses façons de faire et ainsi il se démarque et rayonne par :

- L'excellence de son offre de soins et services intégrés de proximité axée sur l'interdisciplinarité, l'accessibilité et l'adaptation aux besoins de sa population;
- Son courage à questionner et à améliorer ses pratiques professionnelles, cliniques et de gestion;
- La reconnaissance de la contribution de son personnel et la mise en place de pratiques de gestion humaines;
- La force de ses liens avec ses partenaires.

Nos valeurs

Nos actions sont guidées par cinq valeurs, interdépendantes et en équilibre : bienveillance, collaboration, engagement, audace et cohérence.