




PROGRAMME D'INTÉGRATION

Candidate à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) – Soins intensifs

Orientation pratique sous forme de phase d'apprentissage- secteur Soins Intensifs

PLAN A

- **La CEPI doit être jumelée en tout temps avec sa monitrice clinique**
- La monitrice clinique peut prendre à sa charge un autre usager, mais sa charge de travail doit lui permettre de demeurer disponible en tout temps pour évaluer, soutenir et enseigner à la CEPI
- La CEPI doit réussir la phase actuelle avant de passer à la suivante, une rencontre avec l'ICSPC est nécessaire. Une réévaluation du milieu est effectuée en cas d'échec à l'une des phases.
- Les phases peuvent être raccourcies selon une évaluation de l'ICSPC. La phase 6 est facultative selon l'évolution et les besoins du milieu.

	Phase 1 0 à 20 jour- (1 usager max pour la CEPI, pas d'usager intubé, ni instable)	Phase 2 21 à 40 jour- (2 usagers max pour la CEPI, pas d'usager intubé, ni instable)	Phase 3 41 à 60 jour- (1 usager max pour la CEPI, usager intubé, mais pas instable) Si pas d'intubé, consolidation Phase 2	Phase 4 61 ad 80- (2 usagers max pour la CEPI, 1 usager intubé et un autre non, aucun des usagers ne sont instable)	Phase 5 81 ad 100- Avoir travaillé sur tous les quarts de travail potentiels (2 usagers max pour la CEPI, 1 usager intubé et un autre non, aucun des usagers ne sont instable)	Phase 6 101 ad permis- (1 usager intubé et instable pour la CEPI, en ayant toujours sa monitrice clinique disponible)
Jour	20	20	20	20	20	20
Soir	Ø	20	Ø	20	20	20
Nuit	Ø	Ø	Ø	Ø	20	Ø

PLAN Z

- **La CEPI doit avoir sa charge des usagers stables avec admission complétée, selon le tableau ci-dessous**
- L'ASI / infirmière de plus de 1 an d'expérience aux soins intensifs doit demeurer disponible en tout temps pour répondre aux questions
- Malgré le manque de personnel, **respecter la phase à laquelle le CEPI est en plan A**

Critères d'exclusion :

- Usager instable (se référer à la RS-6022_Encadrement des externes, CEPIA et CEPI)
- Usager intubé (sauf en phase 6)
- Usager nécessitant l'utilisation de plusieurs vasopresseurs
- Instabilité hémodynamique, état de choc
- Usager nécessitant un Pacemaker endoveineux
- Post réanimation immédiate

Exemple d'usagers stables :

- Douleur non contrôlée
- État de conscience altérée (inconscient/ délirium/ symptôme de sevrage aigu)
- Maladies cardio-vasculaires, déséquilibre électrolytique ou arythmie significative nécessitant monitoring cardiaque et médication associée
- Maladie respiratoire, MPOC ou fibrose pulmonaire décompensée nécessitant BiPAP ou Airvo
- Diabète instable sous perfusion d'insuline intraveineuse
- Suivi post-choc anaphylactique

	Phase 1 et 2 0 à 40 jour- Aucune prise en charge d'usager, peut contribuer en apportant son aide aux techniques de soins et collectes de données selon son cahier d'orientation	Phase 3 41 à 60 jour- (1 usager max pour la CEPI, pas d'usager intubé, ni instable)	Phase 4 et 5 61 à 100 jour- (2 usagers max pour la CEPI, pas d'usager intubé, ni instable)	Phase 6 101 ad ad permis- (1 usager max pour la CEPI, usager intubé, mais pas instable)
Jour	20	20	20	20
Soir	Ø	20	20	20
Nuit	Ø	Ø	Ø	Ø