

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
aaaa/mm/jj

NAM : _____ Exp. _____
aaaa/mm

Nom, prénom de la mère : _____

FICHE LIAISON PHARMACIEN-MÉDECIN-IPS TRAITEMENT COVID-19 ET INFLUENZA

Cette fiche de liaison découle de l'application de la règle de soins infirmiers qui permet d'initier un prélèvement à des fins de dépistage d'infections respiratoire dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la loi sur la santé publique.

Le prescripteur autorisé doit évaluer l'admissibilité au traitement et prescrire un traitement au besoin.

☐ J'ai <u>nom, prénom et titre</u> procédé à l'évaluation de l'usager dont le nom figure ci-dessus	
Clairance de créatinine : _____ mL/min (si disponible) Date du résultat : <u>aaaa/mm/jj</u>	
Poids : _____ ☐ kg ☐ lb Taille : _____ ☐ cm ☐ pi	
Cet usager pourrait être admissible à recevoir un traitement antiviral contre la COVID-19 et/ou l'Influenza puisqu'il est considéré comme vulnérable en raison de son risque élevé de complications :	
☐ Présente des symptômes compatibles avec une infection respiratoire aiguë	
☐ Asymptomatique et identifié comme contact étroit → Préciser : ☐ COVID-19 ☐ Influenza ☐ VRS	
☐ Écllosion majeure dans le milieu (recommandation PCI) → Préciser : ☐ COVID-19 ☐ Influenza ☐ VRS	
☐ Médecin traitant, ou IPS ☐ N'a pas de médecin traitant ou d'IPS	
Nom et coordonnées de la pharmacie : _____	
Téléphone : _____ Télécopieur : _____	
Nom et coordonnées du médecin/IPS : _____	
Téléphone : _____ Télécopieur : _____	
RÉSULTATS AU TEST DE DÉPISTAGE QUADRUPLEX	☐ Symptomatique → Date du début des symptômes : <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Asymptomatique
	Date du prélèvement (Quadruplex): <u>aaaa/mm/jj</u>
	Résultat (s) : COVID-19 ☐ Positif ☐ Négatif ☐ En attente
	Influenza ☐ Positif ☐ Négatif ☐ En attente
	VRS ☐ Positif ☐ Négatif ☐ En attente
Médicaments antiviraux contre la COVID nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) → Le traitement doit être débuté dans les 5 jours après le début des symptômes. Un résultat positif est obligatoire pour initier le traitement. Aucune prophylaxie postexposition n'est possible.	
Médicament alternatif au (Paxlovid), en cas d'interactions médicamenteuses/contre-indication médicale. → <u>Référence Portail Santé Montérégie</u> : <i>Extranet</i> : <i>Comité régional services pharmaceutiques Montérégie</i> .	
Médicaments antiviraux contre l'Influenza → Le traitement doit être débuté dans les 48 heures après le début des symptômes. Le traitement peut également être initié en prophylaxie postexposition selon des critères cliniques établis, sans attendre les résultats de laboratoire. → À NOTER : si un traitement est commencé en attente du résultat, le professionnel ayant procédé au dépistage communiquera avec le prescripteur dès l'obtention du résultat de laboratoire.	

Signature de l'infirmière : _____ # permis : _____ Date : aaaa/mm/jj

Nom, prénom de l'infirmière (en lettres moulées) : _____

Coordonnées téléphoniques professionnelles ou courriel : _____

Télécopieur : _____