



Administration sécuritaire de la médication en RAC à la DPD

Saviez-vous que ?

Le port du brassard pour identifier la personne responsable de la médication est une solution **FACILE** qui permet de diminuer les risques d'erreurs d'administration de la médication.

Pourquoi?

- Éviter d'être dérangé et de faire une erreur de médication
- Maximiser la concentration lors de la préparation

Faits intéressants

En RAC, près d'un tiers des incidents (**28 %**) sont dus à des erreurs de médications, représentant **233 événements** entre avril et septembre 2024, selon l'analyse de la DQEPE.

- L'omission d'administrer de la médication est l'erreur la plus fréquente et représente (**38%**) de ces 233 événements.

Les erreurs de médication peuvent entraîner différents problèmes, allant de petits effets secondaires, comme des maux d'estomac, à des problèmes graves, comme une intoxication, et dans certains cas, la mort.

Comment utilise-t-on le brassard?

Déterminer la personne responsable de la médication au début de chaque quart de travail, si possible identifier UNE seule personne par quart de travail;

Identifier la personne responsable sur un tableau ou autre aide visuel;


Repérer le brassard de couleur jaune fluorescent et argenté, rangé dans la pharmacie;

Installer à son bras le brassard **avant** de préparer la médication;

Mentionner à voix haute à ses collègues le début de la préparation de la médication et aviser qu'on ne sera pas disponible pour d'autres tâches à moins d'une urgence;

Porter le brassard tant que l'administration de la médication n'est pas terminée;

Aviser les collègues lorsque l'administration de la médication est terminée.



C'est ensemble que nous ferons la différence. Je compte sur vous!