

GESTION DES MÉDICAMENTS - VOLET HOSPITALIER

Saviez-vous que?



À l'unité de soins, il **est probable que vous ayez à préparer** des médicaments qui ne sont pas stables ou qui ne font pas partis de l'offre de service du Service Centralisé d'Additifs aux Solutés (SCAS).



Afin de garantir l'intégrité du médicament, que ce dernier soit préparé à partir d'un minisac PLUS, d'une seringue ou d'un soluté, il faut débiter l'administration dans les **60 minutes qui suivent la préparation** afin de garantir l'intégrité du médicament. Il ne faut jamais préparer à l'avance des médicaments intraveineux afin d'éviter les risques de contamination microbienne et les erreurs d'administration.

Les produits préparés par la pharmacie sont faits sous une hotte, dans une pièce contrôlée spécialement conçue à cet effet, ce qui nous permet d'avoir une stabilité plus longue que les préparations effectuées sur le comptoir à l'unité de soins.



C'est pourquoi, il est important de toujours utiliser les seringues et les solutés préparés par la pharmacie qui sont disponibles dans votre réfrigérateur.

Les items marqués d'un point de couleur doivent être utilisés en premier car il s'agit d'items qui périmeront plus rapidement.

Comité de gestion des médicaments – volet hospitalier
Mai 2019

Tous unis pour la qualité!