

## SYNDROME D'ALLURE GRIPPAL (SAG)

### Apparition soudaine de fièvre et toux

Accompagnées d'au moins un des symptômes suivants:  
mal de gorge, myalgie, douleur aux articulations, fatigue ou confusion

Isolement - **Gouttelettes - contact**  
Aviser le médecin traitant



- Dépistage d'influenza: **prélèvement des sécrétions nasopharyngées**, (technique Intranet)
- Pour le prélèvement Influenza: utiliser le Floqswabs de la compagnie Copan et le Milieu de transport UTM-RT pour test influenza Copan (bouchon rouge)
- Pour le prélèvement du panel (virus) respiratoire : utiliser le Floqswabs de la compagnie Copan et le milieu de transport viral (bouchon bleu)

**CHSLD, urgence, clinique externe et pour usager hospitalisé sur unité**

**Envoyer spécimen au laboratoire**

**Influenza : Code : ABVRS**

Aviser PCI 2287 lorsque fait

**Résultat du dépistage ABVRS**

si

### Positif

Maintenir usager en isolement  
ad 5 à 7 jours suivant le début  
des symptômes.

### Négatif

Vérifier avec médecin si panel respiratoire  
requis; Si requis :

**Envoyer spécimen au laboratoire**

**Panel (virus) respiratoire : Code : VPCR**

Aviser PCI 2287

### Positif

Maintenir patient en isolement ad  
5 à 7 jours suivant le début des  
symptômes.

**Aviser le médecin traitant**

Tout usager ayant une présentation clinique suggestive de SAG, doit demeurer en isolement jusqu'à le résultat du dépistage

Ne pas oublier que les co-chambres des usagers symptomatiques doivent avoir un isolement préventif