




TRAITEMENT DU CANCER DE LA VESSIE PAR LE BACILLE DE CALMETTE-GUÉRIN (BCG)

Ce que vous devez savoir

L'information présentée dans cette fiche-conseil mettra en lumière tout ce que vous devez savoir concernant le traitement du cancer de la vessie par Bacille de Calmette-Guérin. Elle vous présentera les actions à mettre en place avant et après les traitements, les effets secondaires possibles ainsi que les signes et symptômes à surveiller.

Votre médecin vous a recommandé un médicament, appelé Bacille de Calmette-Guérin (BCG) pour traiter votre cancer de la vessie. Il s'agit d'une bactérie qui a été modifiée et peut ainsi être utilisée comme médicament.

Le médicament est utilisé pour :

- traiter un cancer peu profond (superficiel) de la vessie;
- empêcher la réapparition du cancer ou sa progression après une opération à la vessie.

Le médicament agira en produisant une inflammation de la paroi interne de la vessie. Cette inflammation stimulera le système immunitaire qui constitue la défense de l'organisme contre la maladie.

Le traitement

Le traitement aura lieu **toutes les semaines pendant 6 semaines**.

Le traitement initial pourrait être prolongé pour des traitements d'entretien 2 à 3 mois plus tard et ensuite par des traitements mensuels pendant 12 mois.

Une sonde urinaire sera introduite jusqu'à votre vessie et le traitement consiste à injecter la solution dans ce tube. Puis, si vous êtes capable de retenir la solution de traitement dans votre vessie, la sonde sera immédiatement retirée. La solution devra demeurer dans la vessie pendant un maximum de 2 heures.

Pendant l'heure suivant le traitement, vous devrez :

- vous allongez en alternance sur le dos, puis sur le ventre, ensuite sur le côté gauche puis sur le droit, et ce, en conservant chacune des positions pendant 15 minutes;
- si vous le souhaitez et que vous êtes capable de retenir le traitement, vous pourriez faire cette étape à domicile;
- après 2 heures, vous allez pouvoir uriner;



TRAITEMENT DU CANCER DE LA VESSIE PAR LE BACILLE DE CALMETTE-GUÉRIN

Ce que vous devez savoir

- si vous êtes incapable de retenir la solution de traitement dans votre vessie, l'infirmière gardera la sonde urinaire en place jusqu'à la fin du traitement. Elle laissera ensuite s'écouler l'urine dans un sac collecteur. La sonde sera retirée avant votre départ.

Ce que vous devez faire avant chaque traitement




- Ne buvez pas de liquide 4 heures avant chaque traitement et pendant le traitement (2 heures). La prise de diurétiques (médicaments qui font uriner) doit se faire 2 heures après le traitement.
- Vous présentez à l'heure du rendez-vous.
- Avertissez l'infirmière si, depuis votre dernier traitement, vous vous êtes senti fiévreux, fatigué, si vous avez eu des frissons, si vous avez vu du sang ou des caillots de sang dans votre urine et si vous pensez souffrir d'une infection urinaire. Mentionnez à l'infirmière si vous prenez des antibiotiques.

Il se pourrait que votre traitement soit reporté si vous présentez un ou des symptômes mentionnés ci-dessus.

Ce que vous devez faire après chaque traitement durant les 6 heures suivant l'administration

- Il est important d'uriner en position assise pour éviter les éclaboussures.
- Pour éviter que vos proches soient en contact avec le médicament :
 - Après avoir uriné, versez environ 2 tasses d'eau de javel **non diluée** (eau de javel 6 %) dans la toilette puis fermer le couvercle.
 - Laissez reposer pendant 15 minutes avant de tirer la chasse d'eau. Répétez 2 fois.
 - Nettoyez toute surface qui a été en contact avec l'urine contenant le BCG (ex. : siège de toilette) avec une solution d'eau de javel **diluée** : 30 ml (2 cuillères à soupe) d'eau de javel dans une tasse (250 ml) d'eau tiède. Puis rincez avec de l'eau.
- Lavez-vous vigoureusement les mains et la région génitale avec du savon et de l'eau après avoir uriné.
- Lavez séparément les vêtements qui auraient pu être en contact avec l'urine.



TRAITEMENT DU CANCER DE LA VESSIE PAR LE BACILLE DE CALMETTE-GUÉRIN

Ce que vous devez savoir

Précautions additionnelles

- Buvez 8 à 10 verres de liquide pour rincer la vessie durant les 48 premières heures suivant le traitement (si aucune contre-indication de votre médecin, par exemple une limite liquidienne).
- Évitez les relations sexuelles pendant 24 heures à la suite du traitement. Ensuite, utilisez un condom pendant une semaine.

Effets secondaires possibles

Voici ce que vous pourriez ressentir durant les 2 jours qui suivent votre traitement :


- difficulté à uriner;
- douleur dans le bas du ventre au moment d'uriner;
- envie d'uriner souvent et en petite quantité, de jour comme de nuit;
- présence de sang ou de dépôts blanchâtres ou brunâtres dans les urines;
- légère fièvre (moins de 38,3°C) ou symptômes ressemblant à ceux d'une grippe (fatigue, frissons, maux de tête, maux de gorge, etc.). Dans ce cas, prenez de l'acétaminophène (ex. : Tylenol);
- fatigue;
- perte d'appétit.

**Avisez l'infirmière au triage
et le médecin de l'urgence
de vos traitements de BCG
en cours ainsi que des
symptômes associés.**

Symptômes anormaux à surveiller

Pendant les 6 semaines que durera le traitement, avisez l'infirmière en médecine de jour ou allez à l'urgence si l'un des symptômes suivants persiste plus de 2 jours ou survient immédiatement après le traitement de BCG :

- effets secondaires persistant plus de 2 jours ou s'aggravant;
- présence de sang dans les urines au-delà de 2 jours après le traitement;
- fièvre et frissons;
- besoin fréquent d'uriner;
- douleurs articulaires;
- nausées, vomissements ou diarrhée;
- toux constante;
- douleur ou rougeur aux yeux.
- Incapacité à uriner



TRAITEMENT DU CANCER DE LA VESSIE PAR LE BACILLE DE CALMETTE-GUÉRIN

Ce que vous devez savoir

Important

Dates de vos prochains rendez-vous :

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Approuvé par la Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers

Notre mission

Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec.

Notre vision

Des soins de santé et des services accessibles et efficaces qui s'adaptent aux besoins des Québécois.

Nos ambitions

Le CISSS de la Montérégie-Ouest réalise ses ambitions en osant innover dans ses façons de faire et ainsi il se démarque et rayonne par :

- L'excellence de son offre de soins et services intégrés de proximité axée sur l'interdisciplinarité, l'accessibilité et l'adaptation aux besoins de sa population;
- Son courage à questionner et à améliorer ses pratiques professionnelles, cliniques et de gestion;
- La reconnaissance de la contribution de son personnel et la mise en place de pratiques de gestion humaines;
- La force de ses liens avec ses partenaires.

Nos valeurs

Nos actions sont guidées par cinq valeurs, interdépendantes et en équilibre : bienveillance, collaboration, engagement, audace et cohérence.