Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Québec

TRAJECTOIRE CLINIQUES SPÉCIALISÉES COVID-19 (Hôpital Anna-Laberge)

L'usager a-t-il fièvre (frissons) ou toux et/ou difficultés respiratoires?

NON (VERT)

Pratiques de base

- Hygiène des mains
- Masque de procédure lorsque la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée

Interventions impliquant des aérosols (*broncho, gastro, laryngo*)

- Hygiène des mains
- Pression négative
- Masque N-95
- Blouse imperméable bleue
- Gants à poignets longs (2 paires)
- Protection oculaire (visière)
- Cagoule
- Couvre-chaussures

- Instrument dans un sac de plastique
- Nettoyage de l'instrument, tel que procédure
- Nettoyage de la salle en pression négative par salubrité, *Précautions additionnelles* **Gouttelettes-Contact-Protection oculaire**, et autre isolation, s'il y a lieu (triangle rouge de l'usager)
  - → Après le temps de repos, 21 minutes pour Salle 1 en endo

OUI

CAS SUSPECT DE COVID-19 (ROUGE)

Arrivée dans l'hôpital avec masque de procédure et hygiène des mains

Légers à modérés

- *Précautions additionnelles* **Gouttelettes-Contact-Protection oculaire** et autre isolation, s'il y a lieu (triangle rouge de l'usager)
- L'usager devra mettre un masque et effectuer l'hygiène des mains
- L'usager devra mettre jaquette jaune lavable, gants et masque de procédure lors des déplacements pour examens

- Hygiène des mains
- Blouse imperméable jaune jetable
- Gants
- Masque de procédure
- Protection oculaire

- Désinfection de la salle, précautions additionnelles Gouttelettes-contact-protection oculaire
- Lingette peroxyde d'hydrogène 0,5% (1 fois)
- Attention si n'a pas une précaution additionnelle (triangle rouge de l'usager)

Si interventions générant des aérosols

(*broncho, gastro, laryngo*)

ou

État sévère (FR supérieure à 24/min ou détresse respiratoire aigüe, besoin de + de 4L d'oxygène pour sat. supérieure à 90%, tension artérielle systolique inférieure à 90 mmHg malgré réanimation liquidienne, ou tout autre critère jugé sévère par clinicien)

- Hygiène des mains
- Pression négative
- Masque N-95
- Blouse imperméable bleue
- Gants à poignets longs (2 paires)
- Protection oculaire (visière)
- Cagoule
- Couvre-chaussures

Prélèvements :

- Décontamination extérieure du prélèvement avec une lingette de peroxyde d'hydrogène 0,5%
- Sac biohazard et inscrire « COVID-19 suspectée »

- Instrument dans un sac de plastique
- Nettoyage de l'instrument, tel que procédure
- Nettoyage de la salle en pression négative par salubrité, *Précautions additionnelles* **Gouttelettes-Contact-Protection oculaire**, et autre isolation, s'il y a lieu (triangle rouge de l'usager)
  - → Après le temps de repos, 21 minutes pour Salle 1 en endo