
DESTINATAIRES :	Aux gestionnaires cliniques ainsi qu'à l'ensemble des équipes cliniques autorisées à manipuler les pompes à perfusion de l'Hôpital du Suroît et de l'Hôpital Anna-Laberge.
EXPÉDITEUR :	Marie-Soleil Lafranchise, Conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers, volet sécurité médicamenteuse, DSIEU Josée Conesa, Adjointe au chef de la pharmacie, DSPeM
DATE :	2026-05-28
OBJET :	URGENT - Pénurie de tubulures pour les seringues de pompe pousse-seringue

Il y a actuellement une pénurie de tubulures pour les seringues utilisées avec les pompes pousse-seringue.

CETTE SITUATION SERA RÉGLÉE DÈS AUJOURD'HUI, LE 28 MAI 2026.

Pour le médicament Tazocin I.V.

D'ici là, il est recommandé de transférer le volume de la seringue de Tazocin préparée par la pharmacie dans un mini-sac de 100 mL de NaCl 0,9 %, puis d'utiliser une pompe à perfusion volumétrique pour l'administration.

- Il n'est pas nécessaire de l'installer avec un soluté en dérivé.
- Il est important d'administrer le médicament dans l'heure suivant sa préparation

Veuillez prendre note qu'il est essentiel d'utiliser la bibliothèque de médicaments lors de l'administration du médicament.

Les volumes demeurent inchangés :

Concentration de Tazocin	Volume de la seringue de Tazocin	Volume après reconstitution avec 100 mL (110mL) de NaCl 0,9%
Seringue de Tazocin 2,25 g	10 mL	120 mL
Seringue de Tazocin 3,375 g	15 mL	125 mL
Seringue de Tazocin 4,5 g	20 mL	130 mL

Note : Le sac de 100 mL contient réellement un volume de 110 mL.

Pour les autres médicaments

Communiquer avec la pharmacie pour connaître l'alternative d'administration.

MSL/JC